

ANNEXE 12 : ANNEXES DE L'ETUDE ECOLOGIQUE (DERVENN, NOVEMBRE 2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1

1 Annexe 1 : Méthodologies d'inventaires

1.1 Expertise des végétations et de la flore

L'ensemble de l'aire d'étude a été parcourue à pied par le botaniste. Les végétations ont été relevées selon le code Corine Biotope. Un relevé exhaustif de la flore présente a été réalisé. Une attention particulière a été portée aux espèces à statuts (liste rouge départementale et régionale, protections...), qui le cas échéant ont été dénombrées et localisées à l'aide d'un GPS.

La cartographie des végétations et de la flore d'intérêt a été réalisée sur la base des observations de terrain réalisées en période printanière et estivale en 2017 par Cyril Blond puis complétée en 2019 par le bureau d'études AXE.

1.2 Expertise de la faune

1.2.1 *Méthode d'inventaire des Insectes*

Les insectes sont de très bons indicateurs biologiques mais le grand nombre d'espèces et les difficultés de détermination ne permettent pas d'effectuer des inventaires exhaustifs sur de grandes surfaces. Il convient donc de cibler la prospection entomologique sur des groupes présentant un intérêt patrimonial et dont l'échantillonnage est matériellement utilisable. De manière générale, les meilleures périodes de prospections ont lieu de la fin avril jusqu'au début du mois de septembre : principales périodes durant lesquelles les insectes adultes apparaissent.

Afin de pouvoir augmenter les potentialités de détection, les conditions météorologiques doivent être favorables, la couverture nuageuse, l'absence de vent et de pluviométrie sont des paramètres importants qui ont été pris en compte (voir détails des prospections ci-dessous).

1.2.1.1 Inventaire des Odonates

Les inventaires sont réalisés en recherchant les espèces au statut patrimonial les plus forts au regard des habitats présents sur la zone d'étude (chaque espèce ayant des exigences écologiques qui lui sont propres). Toutes les espèces d'odonates observées lors de ces inventaires ont été identifiées. Les prospections ont été réalisées en utilisant les techniques de capture les plus adaptées pour inventorier ce groupe taxonomique, à savoir la chasse à vue et la recherche d'exuvies.

La chasse à vue se fait généralement par le biais de prospections actives à l'aide d'un filet à papillon et d'une paire de jumelles (Kyte Bonelli 10x42). Les habitats systématiquement prospectés ont été : les fossés, les haies exposés, les prairies et plans d'eau.

Les observations se sont déroulées pendant les heures les plus favorables à l'activité des Odonates (10h – 16h30) par beau temps (températures pas trop fraîches, couverture nuageuse faible et vent modéré).

1.2.1.2 Inventaire des Orthoptères

L'ensemble des milieux favorables à ce groupe d'espèces a été prospecté (prairies, zones rases, zones sableuses, etc.). Les individus rencontrés ont été identifiés au chant (stridulation) ou à vue (en utilisant une épuisette à poissons d'aquarium). Les inventaires ont été réalisés en recherchant les espèces aux statuts patrimoniaux les plus forts au regard des habitats présents sur la zone d'étude (chaque espèce ayant des exigences écologiques qui lui sont propres).

1.2.1.3 Inventaire des Rhopalocères (papillons de jour)

L'inventaire des Rhopalocères s'est effectué à vue, en prospectant les milieux les plus favorables (prairies, haies buissonnantes et fossés). L'identification des différentes espèces est faite à l'aide d'une paire de jumelles et lorsque cela est nécessaire après avoir capturé l'individu au filet. Les prospections se sont déroulées tout au long de la journée dans des conditions météorologiques favorables (absence de vent et de pluie).

1.2.1.4 Inventaire des Coléoptères saproxylophages

L'objectif a été de localiser les arbres potentiellement favorables à ce groupe d'espèces (arbres âgés et/ou présentant des cavités). Généralement, les essences les plus utilisées sont le Chêne pédonculé (*Quercus robur*), le Frêne commun (*Fraxinus excelsior*) et le Châtaignier (*Castanea sativa*). La zone d'étude a été parcourue dans sa totalité à la recherche d'arbres présentant des potentialités d'accueil (cavités contenant un volume important de terreau et situées dans la partie médiane de l'arbre).

1.2.2 Méthode d'inventaire des amphibiens

Les inventaires ont consisté en combinant plusieurs méthodes d'inventaires complémentaires, destinées à pouvoir contacter l'ensemble des espèces présentes dans les habitats de reproduction de la zone d'étude (ornières, fossés et étangs poissonneux).

La première méthode a consisté en la détection diurne et visuelle des pontes. La deuxième méthode a été réalisée de façon nocturne et se basait sur :

- la détection auditive des anoures (crapauds et grenouilles), pour lesquels le chant des mâles en période de reproduction est facilement audible.
- La détection visuelle (à l'aide d'une lampe et d'un troubleau) des adultes des autres espèces d'anoures (n'ayant pas de chant très sonore) ainsi que des urodèles (salamandres et tritons).

Les prospections se sont déroulées dans des conditions climatiques favorables à l'activité des amphibiens et optimales à leur détection (température supérieure à 5°C, absence de vent fort, absence de pluie ou pluie faible lors du passage nocturne).

1.2.3 **Méthode d'inventaire des reptiles**

Des prospections matinales ont été réalisées afin de détecter d'éventuels individus en thermorégulation dans les habitats favorables de la zone d'étude. Ces habitats sont généralement des zones de transition et de lisière (tas de branches et de pierres, vieux bâtiments, pieds de haies, entrée de terriers de lapins et chablis).

Compte-tenu du début tardif de la mission, un inventaire à l'aide plaques à reptiles (insolarius artificiels installés sur les écotones en février) n'a pas pu être réalisé. Ce protocole est le meilleur moyen de comprendre qualitativement et quantitativement le peuplement en reptiles d'une zone d'étude.

1.2.4 **Méthode d'inventaire des mollusques**

Ce groupe a fait l'objet de recherches à vue, une attention particulière ayant été portée à l'Escargot de Quimper qui n'a jamais été relevé sur le site.

1.2.5 **Méthode d'inventaire de l'avifaune**


Des inventaires basés sur la méthode des échantillonnages ponctuels simples (EPS) ont été mis en place. Cette méthode consiste à noter tous les contacts visuels et sonores obtenus au cours d'un passage matinal effectué sur des points dispersés : 26 points d'écoute (soit 52 EPS) ont été réalisés.

Deux passages (2 jours à chaque fois) (espacés de plus de 4 semaines) ont été réalisés :

- L'un afin de tenir compte des nicheurs tardifs (Bondrée apivore, sylvidés, Tourterelle des bois, Guêpier d'Europe, Lorient d'Europe, etc.),
- L'autre afin de donner de prouver la reproduction d'un maximum d'espèces nicheuses. Une attention particulière a été portée sur la détection des comportements révélateurs d'une nidification certaine (nids, nourrissages, défense de territoire, etc.) et les indices indirects de présence ont également été recherchés (pelotes de rejections, plumes et cadavres).

Ces inventaires ont été réalisés entre 6h30 et 11h30 heures du matin par météo favorable (absence de pluie et vent nul notamment).

Outre ces points d'écoute, des prospections ont été réalisées sur l'ensemble du site afin de maximiser les possibilités de contacter des espèces pour lesquelles le protocole IPA n'est pas complètement adapté (Rapaces diurnes, Pie-grièche écorcheur, etc.).



Légende

Périmètre d'étude

Périmètre d'autorisation

Extension

○ Point d'écoute EPS

0 250 500 m



© Copyright - Dervenn Conseils Ingénierie - SIG
Réalisation - Bureau d'études DERVENN - 2020
Sources : GéoBretagne © Droits réservés - Reproduction interdite



Figure 1. Localisation des points d'écoute EPS

1.2.6 *Méthode d'inventaire des Mammifères*

1.2.6.1 Inventaire des Mammifères terrestres

L'ensemble de l'aire d'étude immédiate a été prospectée à la recherche de traces de mammifères (empreintes, fèces, crotties, refectoirs, restes de repas...).

1.2.6.2 Inventaire des Chiroptères

➤ *Recherche de gîtes*

Les gîtes potentiels offerts par les arbres âgés (cavités, écorce décollée...) ont également été recherchés au sein ou à proximité immédiate de l'emprise projet et a été réalisée par le fauniste lors des prospections des insectes saproxylophages. Une sortie dédiée a été réalisée au sein des bâtiments potentiellement impactés.

➤ *Evaluation de l'activité*

Se référer au rapport chiroptère annexé. 3 sessions de parcours avec enregistrement actif ont été réalisées, complétées par 7 points d'enregistrements passifs.

1.3 Difficultés rencontrées

- Les données bibliographiques relevées sur le site ont été présentées au sein de rapports peu précis quant aux méthodes et aires d'études, même si les résultats de contacts d'espèces patrimoniales sont géolocalisés et ont pu être repris et recherchés ;
- Le site est en activité mais les interactions avec les engins n'ont pas gêné les inventaires 2020 ;
- Les plans d'eau et lagunes sont difficiles d'accès du fait de leur forte pente ou de leur substrat meuble sur lequel il est risqué de se déplacer, les abords de lagunes n'ont pas pu faire l'objet de prospection autre qu'à la jumelle pour tous les taxons et par écoute dans le cas des amphibiens.
- Les surfaces de boisements sont importantes et composées très majoritairement d'essences mixtes relativement jeunes. Malgré des recherches dédiées il n'est pas possible d'être certain que des gîtes arborés ponctuels favorables à l'accueil des chiroptères en hauteur sont présents, même si les sujets sont jeunes et en grande majorité résineux. Une mesure dédiée de recherches nocturnes par secteur en amont des travaux a donc été proposée.

2 Annexe 2 : Liste des espèces végétales

Nom latin	Nom commun	DH	PN	PR	LRN	LRR	Remarques
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide des chiens	-	-	-	LC	LC	-
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide capillaire	-	-	-	LC	LC	-
<i>Agrostis curtisii</i> Kerguelen	Agrostide à soie	-	-	-	LC	LC	-
<i>Agrostis x murbeckii</i> Fouill.	Agrostide de Murbeck	-	-	-	-	-	-
<i>Aira caryophylla</i> L.	Canche caryophyllée	-	-	-	LC	DD	-
<i>Ajuga reptans</i> L.	Bugle rampant	-	-	-	LC	LC	-
<i>Alisma plantago-aquatica</i> L.	Plantain d'eau commun	-	-	-	LC	LC	-
<i>Alopecurus geniculatus</i> L.	Vulpin genouillé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Amaranthus hybridus</i> L.	Amarante hybride	-	-	-	NA	-	-
<i>Anacamptis laxiflora</i>	Orchis à fleurs lâches	-	-	-	LC	LC	-
<i>Anagallis arvensis</i> L. subsp. <i>arvensis</i>	Mouron rouge	-	-	-	LC	LC	-
<i>Anagallis tenella</i> (L.) L.	Mouron délicat	-	-	-	LC	LC	-
<i>Andryala integrifolia</i> L.	Andryale à feuilles entières	-	-	-	LC	LC	-
<i>Angelica sylvestris</i> L.	Angélique sauvage	-	-	-	LC	LC	-
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	Flouve odorante	-	-	-	LC	LC	-
<i>Apium nodiflorum</i> (L.) Lag.	Ache nodiflore	-	-	-	LC	LC	-
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh.	Arabette de Thalius	-	-	-	LC	LC	-
<i>Arctium minus</i> (Hill) Bernh.	Bardane à petites têtes	-	-	-	LC	LC	-
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl subsp. <i>bulbosum</i> (Willd.) SchÄbl. & G.Martens	Fromental élevé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	-	-	-	LC	LC	-
<i>Asphodelus arrondeau</i> J.Lloyd	Asphodèle d'Arrondeau	-	PN	-	LC	-	-
<i>Avena barbata</i> Pott ex Link subsp. <i>barbata</i>	Avoine barbu	-	-	-	LC	LC	-
<i>Baccharis halimifolia</i> L.	Séneçon en arbre	-	-	-	-	-	Introduite envahissante
<i>Baldellia ranunculoides</i> (L.) Parl. subsp. <i>ranunculoides</i>	Flûteau fausse-renoncule	-	-	-	LC	DD	-
<i>Ballota nigra</i> L. subsp. <i>foetida</i> Hayek	Ballote du midi	-	-	-	LC	-	-
<i>Bellis perennis</i> L. subsp. <i>perennis</i>	Pâquerette	-	-	-	LC	LC	-
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	-	-	-	LC	LC	-
<i>Bidens tripartita</i> L.	Bident trifolié	-	-	-	LC	LC	-

Nom latin	Nom commun	DH	PN	PR	LRN	LRR	Remarques
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) <i>Huds. subsp. perfoliata</i>	Chlorette	-	-	-	LC	-	-
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) <i>P.Beauv.</i>	Brachypode penné	-	-	-	DD	-	-
<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) <i>P.Beauv. subsp. rupestre</i>	Brachypode des rochers	-	-	-	LC	DD	-
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome mou	-	-	-	LC	LC	-
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	-	-	-	LC	LC	-
<i>Bryonia dioica</i> Jacq.	Racine-vierge	-	-	-	-	-	-
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	Callune	-	-	-	LC	LC	-
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	-	-	-	LC	LC	-
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) <i>Medik. subsp. bursa-pastoris</i>	-	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cardamine pratensis</i> L.	Cardamine des prés	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cardamine hirsuta</i> L.	Cardamine hérissée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Carduus tenuiflorus</i> Curtis	Chardon à petites fleurs	-	-	-	LC	LC	-
<i>Carex demissa</i> Hornem.	Laïche vert jaunâtre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Carex hirta</i> L.	Laïche hérissée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Carex ovalis</i> Gooden.	Laïche Patte-de-lièvre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Châtaignier	-	-	-	LC	LC	-
<i>Centaurea gr. pratensis</i>	Centaurée de Debeaux	-	-	-	LC	LC	-
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn <i>subsp. erythraea</i>	Erythrée petite centaure	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	Céraiste aggloméré	-	-	-	LC	LC	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Chénopode blanc	-	-	-	LC	LC	-
<i>Chrysanthemum segetum</i> L.	Chrysanthème des moissons	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cicendia filiformis</i> (L.) <i>Delarbre</i>	Cicendie filiforme	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cirsium filipendulum</i> Lange	Cirse Filipendule	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop.	Cirse des marais	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cladium mariscus</i> (L.) Pohl	Marisque	-	-	-	LC	LC	-
<i>Conium maculatum</i> L.	Grande cigüe	-	-	-	LC	LC	-
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	-	-	-	LC	LC	-
<i>Coryza floribunda</i> Kunth	Vergerette à fleurs nombreuses	-	-	-	LC	LC	-
<i>Coronopus didymus</i> (L.) Sm.	Corne-de-cerf didyme	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & <i>Corylus avellana</i> L.	Herbe de la pampa	-	-	-	NA	-	Introduite envahissante
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. <i>subsp. monogyna</i>	Noisetier	-	-	-	LC	LC	-
<i>Crassula tillaea</i> Lest.-Garl.	Crassule mousse	-	-	-	LC	LC	-
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq. <i>subsp. monogyna</i>	Aubépine à un style	-	-	-	LC	LC	-
<i>Crepis biennis</i> L.	Crépide bisannuelle	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cuscuta epithymum</i> (L.) L. <i>subsp. epithymum</i>	Cuscuta à petites fleurs	-	-	-	LC	LC	-
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link	Genêt à balais	-	-	-	LC	LC	-
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle agglomérée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	-	-	-	LC	LC	-
<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) <i>P.Beauv.</i>	Canche cespitueuse-	-	-	-	LC	LC	-
<i>Digitalis purpurea</i> L.	Digitale pourpre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Diplotaxis tenuifolia</i> (L.) DC.	Diplotaxe vulgaire	-	-	-	LC	LC	-
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	-	-	-	LC	LC	-
<i>Dittrichia graveolens</i> (L.) Greuter	Inule fétide	-	-	-	LC	LC	-
<i>Dryopteris affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk. subsp.	Dryopteris écaillée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) <i>A.Gray</i>	Dryopteris dilatée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) <i>Schott</i>	Fougère mâle	-	-	-	LC	LC	-
<i>Echium vulgare</i> L.	Vipérine commune	-	-	-	LC	LC	-
<i>Eleocharis palustris</i> (L.) <i>Roem. & Schult.</i>	Scirpe des marais	-	-	-	LC	LC	-

Nom latin	Nom commun	DH	PN	PR	LRN	LRR	Remarques
<i>Eleocharis uniglumis</i> (Link) Schult.	Scirpe à une écaille	-	-	-	LC	LC	-
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	-	-	-	LC	LC	-
<i>Equisetum telmateia</i>	Grande prêle	-	-	-	LC	LC	-
<i>Erica ciliaris</i> Loeff. ex L.	Bruyère ciliée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Erica cinerea</i> L.	Bruyère cendrée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) subsp. <i>cutitatum</i>	Cicutaire	-	-	-	LC	LC	-
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. subsp. <i>cannabinum</i>	Chanvre d'eau	-	-	-	LC	LC	-
<i>Exaculum pusillum</i>	Cicendie naine	-	-	-	LC	NT	-
<i>Fagus sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i>	Hêtre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque roseau	-	-	-	LC	LC	-
<i>Festuca gr. rubra</i>	Fétuque des sables	-	-	-	LC	DD	-
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier sauvage	-	-	-	LC	LC	-
<i>Frangula alnus</i> Mill.	Bourgène	-	-	-	LC	LC	-
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	-	-	-	LC	LC	-
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet commun	-	-	-	LC	LC	-
<i>Galium palustre</i> L.	Gaillet des marais	-	-	-	LC	LC	-
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Geranium purpureum</i> Vill.	Géranium pourpre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Geranium robertianum</i> L.	Herbe à Robert	-	-	-	LC	LC	-
<i>Geranium sanguineum</i> L.	Géranium sanguin	-	-	-	LC	LC	-
<i>Glyceria declinata</i>	Glycérie dentée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant	-	-	-	LC	LC	-
<i>Heracleum sphondylium</i> L. subsp. <i>sphondylium</i>	Grande Berce	-	-	-	LC	LC	-
<i>Himantoglossum hircinum</i>	Orchis bouc	-	-	-	LC	LC	-
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	-	-	-	LC	LC	-
<i>Holcus mollis</i> L. subsp. <i>mollis</i>	Houlque molle	-	-	-	LC	LC	-
<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	Ecuelle d'eau	-	-	-	LC	LC	-
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Hypericum pulchrum</i> L.	Millepertuis élégant	-	-	-	LC	LC	-
<i>Hypericum tetrapterum</i> Fr.	Millepertuis à quatre ailes	-	-	-	LC	LC	-
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Houx	-	-	-	LC	LC	-
<i>Iris foetidissima</i> L.	Iris foetide	-	-	-	LC	LC	-
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux acore	-	-	-	LC	LC	-
<i>Jasione montana</i> L. subsp. <i>montana</i>	Herbe à midi	-	-	-	LC	LC	-
<i>Juncus acutiflorus</i> Ehrh. ex Hoffm.	Jonc à tépales aigus	-	-	-	LC	LC	-
<i>Juncus bufonius</i> L.	Jonc des crapauds	-	-	-	LC	LC	-
<i>Juncus bulbosus</i> L.	Jonc couché	-	-	-	LC	LC	-
<i>Juncus capitatus</i> Weigel	Jonc à inflorescence globuleuse	-	-	-	LC	LC	-
<i>Juncus conglomeratus</i> L.	Jonc aggloméré	-	-	-	LC	LC	-
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	-	-	-	LC	LC	-
<i>Kickxia elatine</i> (L.) Dumort. subsp. <i>elatine</i>	Kickxia élatine	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lapsana communis</i> L.	Lapsane commune	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lathyrus latifolius</i> L.	Gesse à larges feuilles	-	-	-	LC	LC	-
<i>Laurus nobilis</i> L.	Laurier-sauce	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lavatera arborea</i> L.	Mauvre en arbre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	Marguerite commune	-	-	-	DD	LC	-
<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Linaire rampante	-	-	-	LC	LC	-
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	Lianire commune	-	-	-	LC	LC	-

Nom latin	Nom commun	DH	PN	PR	LRN	LRR	Remarques
<i>Linum bienne</i> Mill.	Lin bisannuel	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lobelia urens</i> L.	Lobélie brûlante	-	-	-	LC	LC	-
<i>Logfia minima</i> (Sm.) Dumort.	Cotonnière naine	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	lvraie multiflore	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lolium perenne</i> L.	lvraie vivace	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lonicera periclymenum</i> L.	Chèvrefeuille des bois	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lotus corniculatus</i> L. subsp. <i>corniculatus</i>	Sabot-de-la-mariée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lotus subbiflorus</i> Lag.	Lotier hispide	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	Lotus des marais	-	-	-	LC	LC	-
<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Luzule multiflore	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	Œil-de-perdrix	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.	Pomme d'amour	-	-	-	NA	-	Introduite
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lythrum hyssopifolia</i> L.	Salicaire à feuilles d'hyssope	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lythrum portula</i> (L.) D.A.Webb	Pourprier d'eau	-	-	-	LC	LC	-
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	-	-	-	LC	LC	-
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Pommier cultivé	-	-	-	-	-	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)
<i>Matricaria discoidea</i> DC.	Matricaire fausse- camomille	-	-	-	NA	-	Introduite
<i>Medicago lupulina</i> L.	Luzerne lupuline	-	-	-	LC	LC	-
<i>Melilotus albus</i> Medik.	Méillot blanc	-	-	-	LC	-	Introduite
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	-	-	-	LC	LC	-
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	Menthe à feuilles rondes	-	-	-	LC	LC	-
<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench subsp. <i>caerulea</i>	Molinie bleue	-	-	-	LC	LC	-
<i>Myriophyllum spicatum</i> L.	Myriophylle à épis	-	-	-	LC	LC	-
<i>Oenanthe crocata</i> L.	Oenanthe safranée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Oenothera stricta</i> Ledeb. ex Link	Onagre dressée	-	-	-	NA	-	Introduite
<i>Ononis repens</i> L.		-	-	-	NA	-	Introduite
<i>Ophrys apifera</i> Huds.	Ophrys abeille	-	-	-	LC	LC	Annexe B CITES
<i>Orchis morio</i> L.	Orchis bouffon	-	-	-	LC	LC	Annexe B CITES
<i>Ornithopus perpusillus</i> L.	Ornithope délicat	-	-	-	LC	LC	-
<i>Osmunda regalis</i> L.	Osmonde royale	-	-	-	LC	LC	-
<i>Parentucellia viscosa</i> (L.) Caruel	Bartsie visqueuse	-	-	-	LC	LC	-
<i>Pastinaca sativa</i> L.	Panais cultivé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Pedicularis sylvatica</i> L. subsp. <i>sylvatica</i>	Herbe aux poux	-	-	-	LC	LC	-
<i>Phleum pratense</i> L.	Fléole des prés	-	-	-	LC	LC	-
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau	-	-	-	LC	LC	-
<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse Vipérine	-	-	-	LC	LC	-
<i>Pilularia globulifera</i> L.	Pilulaire	-	PN	-	LC	LC	-
<i>Pinus pinaster</i> Aiton	Pin maritime	-	-	-	LC	LC	-
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	-	-	-	LC	LC	-
<i>Plantago major</i> L. subsp. <i>major</i>	Plantain à bouquet	-	-	-	LC	LC	-
<i>Poa annua</i> L.	Pâturin annuel	-	-	-	LC	LC	-
<i>Poa trivialis</i> L. subsp. <i>trivialis</i>	Gazon d'Angleterre	-	-	-	LC	LC	-
<i>Polycarpon tetraphyllum</i> (L.)	Polycarpon à quatre feuilles	-	-	-	LC	LC	-
<i>Polygala vulgaris</i> L. subsp. <i>collina</i> (Rchb.) Borbàs	Polygala des collines	-	-	-	LC	LC	-
<i>Polygonum aviculare</i> L.	Renouée des oiseaux	-	-	-	LC	LC	-
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	-	-	-	LC	LC	-
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas	Polypode intermédiaire	-	-	-	LC	LC	-
<i>Polypogon maritimus</i> Willd. subsp. <i>maritimus</i>	Polypogon maritime	-	-	-	LC	LC	-
<i>Potamogeton crispus</i> L.	Potamot crépu	-	-	-	LC	LC	-

Nom latin	Nom commun	DH	PN	PR	LRN	LRR	Remarques
<i>Tamus communis</i> L.	Sceau de Notre Dame	-	-	-	LC	LC	-
<i>Taxus baccata</i> L.	If à baies	-	-	-	LC	LC	-
<i>Teucrium scorodonia</i> L. <i>subsp. scorodonia</i>	Germandrée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Thelypteris palustris</i> Schott	Fougère des marais	-	-	-	LC	LC	-
<i>Trifolium dubium</i> Sibth.	Trèfle douteux	-	-	-	LC	LC	-
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	-	-	-	LC	LC	-
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle rampant	-	-	-	LC	LC	-
<i>Trifolium striatum</i> L.	Trèfle strié	-	-	-	LC	LC	-
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trèfle semeur	-	-	-	LC	LC	-
<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	Héliantheme taché	-	-	-	LC	LC	-
<i>Tussilago farfara</i> L.	Tussilage	-	-	-	LC	LC	-
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles	-	-	-	LC	LC	-
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ajonc d'Europe	-	-	-	LC	LC	-
<i>Ulex gallii</i> Planch.	Ajonc de Le Gall	-	-	-	LC	LC	-
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Petite orme	-	-	-	LC	LC	-
<i>Umbilicus rupestris</i> (Salisb.) Dandy	Nombriil de vénus	-	-	-	LC	LC	-
<i>Urtica dioica</i>	Ortie dioïque	-	-	-	LC	LC	-
<i>Verbascum thapsus</i> L.	Molène bouillon-blanc	-	-	-	LC	LC	-
<i>Veronica arvensis</i> L.	Véronique des champs	-	-	-	LC	LC	-
<i>Vicia cracca</i> L.	Vesce cracca	-	-	-	LC	LC	-
<i>Vicia hirsuta</i> (L.) S.F.Gray	Vesce hérissée	-	-	-	LC	LC	-
<i>Vicia sativa</i> L.	Vesce cultivée	-	-	-	NA	LC	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)
<i>Vicia sativa</i> L. <i>subsp. nigra</i> (L.) Ehrh.	Vesce à feuilles étroites	-	-	-	LC	DD	-
<i>Vicia sativa</i> L. <i>subsp. sativa</i>	Poisette	-	-	-	-	-	Introduite non établie (dont cultivée ou domestique)
<i>Vicia sepium</i>	Vesce des haies	-	-	-	LC	LC	-
<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb. <i>subsp.</i>	Lentillon	-	-	-	LC	LC	-
<i>Vulpia bromoides</i> (L.) S.F.Gray	Vulpie queue-d'éccureuil	-	-	-	LC	LC	-
Nb d'espèces observées	253						

3 Annexe 3 : Bibliographie

ACEMAV coll., DUGUET R. & MELKI F. ed., 2003 – les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France). 480 p.

Anonyme, 2006 – Convention Relative à la Conservation de la vie sauvage et du Milieu Naturel de l'Europe ; Groupe d'experts sur la conservation des amphibiens et des reptiles. Direction de la Culture et du Patrimoine culturel et naturel. 35 p.

ARNOLD N. & OVENDEN D., 2002 – Le guide herpéto ; 199 amphibiens et reptiles d'Europe. éd Delachaux & Niestlé, Paris, 288p.

ARTHUR L. & LEMAIRE M., 2009. – Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (Collection Parthénope) ; Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris, 544 p.

BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004 – Birds in the European Union : a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International, 59 p.

BISSARDON M., GUIBAL L. & RAMEAU J.-C., 1997 – CORINE Biotopes - Version originale - Types d'habitats français ; Ecole nationale du génie rural et des eaux et forêts, Laboratoire de recherches en sciences forestières, Nancy (France), 339 p.

BOST C.A., 1994. Fauvette pitchou *Sylvia undata* in Yeatman-Berthelot D. & Jarry G. Nouvel Atlas des Oiseaux Nicheurs de France (1985-1989) S.O.F., Paris : 562-563

BOUR R., CHEYLAN M., CROCHET P.A., GENIEZ Ph., GUYETANT R., HAFFNER P., INEICH I., NAULLEAU G., OHLER N. & LESCURE J., 2008 – Liste taxinomique actualisée des Amphibiens et Reptiles de France. Bull. Soc. Herp. Fr., 126 : 37-43.

Bretagne vivante, Atlas provisoire des gastéropodes terrestres de Bretagne, 2001, 35p.

Centre de ressources espèces exotiques envahissantes : <http://especes-exotiques-envahissantes.fr/>

COMMISSION EUROPEENNE, 2007 – Interpretation manual of european union habitats, version EUR27, 142 p.

DANTON P. & BAFFRAY M. (dir. sc. Reduron J.-P.), 1995 – Inventaire des plantes protégées en France. Ed. Nathan, Paris / A.F.C.E.V., Mulhouse, 296 p.

DUBOIS Ph.J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P., 2008 – Nouvel inventaire des oiseaux de France. Ed. Delachaux et Niestlé, Paris, 560 p.

DUPONT P., 2001.- Programme national de restauration pour la conservation de Lépidoptères diurnes (Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae et Nymphalidae). Document de travail, OPIE, 200p.

FIERS V., GAUVRIT B., GAVAZZI E., HAFFNER P., MAURIN H. & coll. 1997 – Statut de la faune de France métropolitaine. Statuts de protection, degré de menaces, statuts biologiques. MNHN/IEGB/SPN, RNF, Min. Env. 225 p.

FOURNIER P., 1947 (rééd. 1990) – Les quatre flores de France. Ed. Lechevalier, Paris, 1104 p.

GRETIA, 2009 - Invertébrés continentaux de Bretagne

GROUPE ORNITHOLOGIQUE BRETON, Atlas des oiseaux nicheurs de Bretagne, 2012

I.U.C.N., 2003 – IUCN Red List of Threatened Species. Consultable sur Internet à l'adresse <http://www.redlist.org/search/search-expert.php>

KREINER G., 2007 – The Snakes of Europe. Edition Chimaira (Germany). 317p.

LACROIX et al., 2009 – Liste " rouge " départementale des plantes vasculaires rares et/ou en régression en Loire-Atlantique

MARCHADOUR B. (coord.). 2009. Mammifères, amphibiens et reptiles prioritaires en Pays de la Loire . Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional Pays de la Loire, 125 p

MARCHADOUR B., BEAUDOUIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON D. & YESOU P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire . Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p.

MAURIN H., KEITH P., 1994 – Inventaire de la faune menacée en France. MNHN / WWF / Nathan, Paris. 176 p.

MNHN, 2001 – Cahiers d'habitats forestiers, La Documentation Française, vol 2, 423p.

MNHN, 2005 – Cahiers d'habitats agropastoraux, La Documentation Française, tome 4, vol. 2, 487p.

Muller, S. (coord.) 2004. Plantes invasives en France. Muséum national d'Histoire naturelle, Paris (patrimoine naturel, 62). 168 p.

OLIVIER L., GALLAND J.-P., MAURIN H., & ROUX J.-P., 1995 – Livre rouge de la flore menacée de France. Tome I : Espèces prioritaires. Muséum National d'Histoire Naturelle / Conservatoire Botanique National de Porquerolles / Ministère de l'Environnement édts, 621 p.

PENN AR BED 227, 2017 : Conservation de la faune et de la flore : Listes rouges et responsabilité de la Bretagne, 108 p.

Quere, E., Magnanon, S., & Brindejonc, O. 2015. Liste rouge de la flore vasculaire de Bretagne - Evaluation des menaces selon la méthodologie et la démarche de l'UICN. DREAL Bretagne, Conseil régional de Bretagne, FEDER Bretagne. Conservatoire botanique national de Brest. 44 pp. + annexes.

ROCAMORA G. & YEATMAN-BERTHELOT D., 1999 – Oiseaux menacés et à surveiller en France. Société d'Etudes Ornithologique de France (SEOF) et Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). Paris, 598 p.

Trame verte et bleue (SRCE) Bretagne : <http://www.tvb-bretagne.fr/consultation>

THIOLLAY J.M. & BRETAGNOLLE V., 2004 – Rapaces nicheurs de France, distribution, effectifs et conservation. Delachaux et Niestlé, 175 p.

UICN France, MNHN & SHF (2021). La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mollusques continentaux. Paris, France

UICN France, MNHN & SHF (2015). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles et amphibiens de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS. 2016. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. 31 pp.

UICN France, MNHN, Opie & SEF (2012). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Papillons de jour de France métropolitaine. Dossier Électronique.

UICN France, MNHN, OPIE & SFO (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Libellules de France métropolitaine. Paris, France.

UICN France, MNHN, SFEPM & ONCFS. 2017. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Mammifères de France métropolitaine. Paris, France. 15 pp.

4 Annexe 4 : liste des habitats génériques du site de la Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannenec

▼ 1130 - Estuaires (56,03 ha)

▼ 1140 - Replats boueux ou sableux exondés à marée basse (6,01 ha)

▼ 1150 - Lagunes côtières * (0,01 ha)

▼ 1170 - Récifs (1,77 ha)

▼ 1210 - Végétation annuelle des laissés de mer (0,11 ha)

▼ 1220 - Végétation vivace des rivages de galets (0,11 ha)

▼ 1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques (14,4 ha)

▼ 1320 - Prés à Spartina (*Spartinion maritimae*) (0,78 ha)

▼ 1330 - Prés-salés atlantiques (*Glauco-Puccinellietalia maritimae*) (5,5 ha)

▼ 1410 - Prés-salés méditerranéens (*Juncetalia maritimi*) (0,01 ha)

▼ 2110 - Dunes mobiles embryonnaires (2,33 ha)

▼ 2120 - Dunes mobiles du cordon littoral à *Ammophila arenaria* (dunes blanches) (11,99 ha)

▼ 2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) * (26,41 ha)

▼ 2180 - Dunes boisées des régions atlantique, continentale et boréale (0,03 ha)

▼ 2190 - Dépressions humides intradunaires (9,68 ha)

▼ 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (37,31 ha)

▼ 4030 - Landes sèches européennes (26,45 ha)

▼ 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (0,25 ha)

▼ 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (27,18 ha)

5 Annexe 5 : liste des espèces ayant justifié le classement du site Natura 2000 « Rivière Laïta, Pointe du Talud, étangs du Loc'h et de Lannénec »

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1303 - *Rhinolophus hipposideros* – Petit rhinolophe

1304 - *Rhinolophus ferrumequinum* – Grand rhinolophe

1308 - *Barbastella barbastellus* – Barbastelle d'Europe

1324 - *Myotis myotis* – Grand murin

1355 - *Lutra lutra* – Loutre d'Europe

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1095 - *Petromyzon marinus* – Lamproie marine

1096 - *Lampetra planeri* – Lamproie de planer

1102 - *Alosa alosa* – Grande alose

1103 - *Alosa fallax* – Alose feinte

1106 - *Salmo salar* – Saumon atlantique

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1007 - *Elona quimperiana* – Escargot de Quimper

1044 - *Coenagrion mercuriale* – Agrion de Mercure

1083 - *Lucanus cervus* – Lucane cerf-volant

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

1421 - *Vandenboschia speciosa* – Trichomanès remarquable

1441 - *Rumex rupestris* – Rumex des rochers

1903 - *Liparis loeselii* – Liparis de Loese

6 Annexe 6 : inventaire des zones humides

7 Annexe 7 : Diagnostic détaillé des chiroptères (Ogéó)



O-GEO

La Cribotière
44 521 COUFFE
06 33 07 64 48
contact@o-geo.net
www.o-geo.net

Carrière de Lann Vrian - Imerys Ploemeur (56)

Analyse de l'activité des Chiroptères

Octobre 2020



CADRE ADMINISTRATIF

Projet Carrière de Lann Vrian - Imerys

Commune Ploemeur

Département Morbihan (56)

Maître d'ouvrage Imerys

Maître d'œuvre Dervenn
Siège social : 9, rue de la Motte d'Ille - 35830 Betton
Pays de la Loire : 20, rue de la forêt - 44810 Héric

Référent Vincent GUILLEMOT

Sujet du rapport Analyse de l'activité des Chiroptères :
- Peuplement ;
- Indices d'activité ;
- Cartographie.

Période d'étude Mai, juillet et août 2020

Réalisation de l'état initial Philippe PROUX (gestion des équipements et assistance technique)
Fanny COULON (gestion, analyse de séquences, cartographie et traitement statistique)
Laurent GOURET (relevé de terrain, analyse de séquences, analyse de résultats et rédaction)

Date du rendu 13/09/2020 (1^{ère} version)
26/10/2020 (2^{ème} version intégrant la cartographie des habitats)

Partie 1 - INTRODUCTION.....	4
I - LOCALISATION DE L'AIRE D'ÉTUDE.....	4
II - MISSION	4
Partie 2 - ÉTAT INITIAL.....	6
I - MÉTHODOLOGIE	6
A - Aire d'étude.....	6
B - Session, point d'écoute, parcours et durée de l'écoute.....	6
1 - Session.....	6
2 - Point d'écoute.....	6
3 - Parcours.....	12
4 - Caractérisation des habitats.....	12
5 - Durée cumulée de l'écoute de l'activité des Chiroptères.....	14
6 - Conditions météorologiques.....	15
C - Matériel de détection, d'enregistrement et d'analyse.....	16
1 - Matériel de détection et d'enregistrement.....	16
2 - Logiciel d'identification des séquences.....	16
3 - Logiciel de traitement des séquences.....	16
D - Matériel de géoréférencement des séquences sur parcours.....	16
E - Détermination des taxons.....	16
F - Traitement des données.....	17
1 - De l'enregistrement à la séquence puis au contact.....	17
2 - Géolocalisation des séquences.....	17
3 - Évaluation d'indice d'activité par point d'écoute.....	17
a - Analyse par taxon.....	17
b - Analyse par groupe.....	18
G - Analyse de l'activité.....	18
1 - Liste des espèces inventoriées.....	18
2 - Activité à l'échelle du peuplement.....	18
3 - Activité spécifique.....	18
4 - Activité le long du parcours et influence des habitats au sein de l'aire d'étude.....	19
II - RÉSULTATS.....	20
A - Liste des espèces inventoriées.....	20
B - Activité des Chiroptères.....	23
1 - À l'échelle du peuplement chiroptérologique.....	23
a - Niveau de présence.....	23
b - Diversité et densité par point.....	24
c - Diversité et densité le long du parcours.....	25
d - Analyse de l'influence des habitats le long du parcours.....	27
e - Profil journalier de l'activité par point.....	29
2 - À l'échelle des espèces.....	30
a - Les espèces très communes.....	30
i - La Pipistrelle commune.....	30
ii - La Pipistrelle de Kuhl.....	32
iii - L'Oreillard gris.....	34
iv - La Pipistrelle de Nathusius.....	36
v - La Barbastelle d'Europe.....	38
vi - La Noctule de Leisler.....	40
b - Les espèces communes.....	42
i - Le Murin de Daubenton.....	42
ii - La Sérotine commune.....	44
iii - Le Grand rhinolophe.....	44
c - Les espèces peu communes.....	47
i - Le Murin de Natterer.....	47
ii - Le Murin à moustaches.....	47
iii - La Noctule commune.....	47
d - Les espèces localisées.....	47
C - Synthèse des niveaux de fréquentation.....	51
D - Synthèse des potentialités de gîtes.....	52
III - CONCLUSION.....	54
TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	55
INDEX DES TABLEAUX	55
INDEX DES GRAPHIQUES	55
INDEX DES CARTES.....	56
INDEX DES PHOTOGRAPHIES	56

Partie 1 - INTRODUCTION

I - LOCALISATION DE L'AIRE D'ÉTUDE

L'aire d'étude est située sur la Commune de Ploemeur dans le département du Morbihan (56), au lieu-dit Lann Vrian. Elle occupe le périmètre actuel de la carrière exploitée par la société Imerys, et des périmètres périphériques identifiés pour son extension (Carte 1).

II - MISSION

Le bureau d'études O-GEO est missionné pour analyser des séquences issues d'une campagne d'enregistrement des émissions de Chiroptères. Cette analyse permet :

- D'identifier les espèces présentes ;
- De définir le peuplement présent durant la période contrôlée ;
- D'évaluer le niveau de fréquentation des espèces de Chiroptères.

Partie 2 - ÉTAT INITIAL

I - MÉTHODOLOGIE

A - Aire d'étude

L'aire d'étude qui suit les délimitations du site de la carrière en exploitation couvre quatre grands types de milieu (Carte 2, Carte 3) : le milieu minéral (usine, accès, terrils, excavation, etc.), le milieu aquatique (fond de fosse, lagune), le milieu forestier (à dominante Pinède) et le fourré (roncier, lande secondaire, etc.). Les points d'eau, les Pinèdes et parfois les fourrés peuvent être considérés comme attractifs pour les Chiroptères pour peu que les Insectes les colonisent. Les Pinèdes sont présentes dans la marge nord et au centre de l'aire d'étude. Les points d'eau sont présents sur l'ensemble de l'aire d'étude et sont de tailles diverses, de surfaces plus importantes quand il s'agit de lagune. Les fourrés se développent sur les talus le long des accès ou des lagunes et les secteurs délaissés par l'extraction, le stockage et les accès.

L'aire d'étude étendue au projet d'extension concerne :

- Un boisement au nord-est ;
- Une culture associée à un milieu hétérogène ligneux à l'est ;
- Une prairie comptant quelques linéaires de haie au sud ;
- Un fourré associé à une Pinède et une prairie à l'ouest.

Au sein de l'aire d'étude étendue, les Pinèdes, les haies voire les fourrés peuvent constituer des habitats attractifs pour les Chiroptères.

B - Session, point d'écoute, parcours et durée de l'écoute

1 - Session

L'étude sur point d'écoute s'appuie sur trois sessions :

- En période estivale (mise-bas et élevage des jeunes) :
 - o 04/06/2020
 - o 02/07/2020
- En période automnale (transit entre gîte estival et gîte hivernal) :
 - o 26/08/2020.

Les relevés permettent éventuellement de distinguer la présence d'un gîte en période de mise-bas et en période de transit, à proximité des points d'écoute.

2 - Point d'écoute

La méthode du point d'écoute consiste à mesurer l'activité à proximité d'un habitat soit considéré comme attractif (lisière de boisement, de haie arborée, d'étang ou de cours d'eau), soit pour lequel l'attractivité des Chiroptères doit être évaluée.

L'activité est mesurée grâce à un détecteur-enregistreur d'ultrason fonctionnant en mode automatique.

Les appareils sont placés sur 8 points en lisière de milieux considérés comme attractifs pour les Chiroptères (Carte 2, Carte 3) :


- En lisière de boisements :
 - o Point 1 bis : en lisière de boisement, dans une allée boisée (Photo. 3 ; Photo. 4) ;
 - o Point 2 : en lisière d'un boisement clair mixte donnant sur une culture de blé (Photo. 5, Photo. 6) ;
 - o Point 3 : en lisière de Pinède donnant sur un chemin élargi (Photo. 8) ;
 - o Point 4 : en lisière d'un cordon relictuel de Pinède donnant sur une large piste (Photo. 9) ;
- En lisière de haie :
 - o Point 1 : en lisière de haie arbustive haute donnant sur un terrain vague (Photo. 1, Photo. 2) ;
 - o Point 8 : en lisière de haie arborée donnant sur une prairie, dans un contexte de lande littorale (Photo. 15, Photo. 16) ;
- Au sein d'un fourré :
 - o Point 5 : à 17 m d'une Pinède (Photo. 10) ;
- En rive de plan d'eau
 - o Point 7 : sur la rive de la lagune située au sud de l'aire d'étude (Photo. 13, Photo. 14) ;
- En lisière de mixte :
 - o Point 6 : en lisière d'une ligne de Pin qui longe une large fosse en eau (Photo. 11, Photo. 12).

Le point 1 a été déplacé en cours de l'étude de manière à se rapprocher du secteur d'extension et à relever l'activité en lisière de boisement.

Ces points permettent donc de contrôler la fréquentation des Chiroptères dans différents secteurs et les principaux milieux de l'aire d'étude.



Carte 2 : localisation des protocoles points d'écoute et parcours sur vue aérienne



Carte 3 : localisation des protocoles points d'écoute et parcours sur IGN



Photo. 1 : Batcorder 3.0 et son environnement au point 1 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 2 : environnement au point 1 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 3 : Batcorder 3.0 au point 1bis (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 4 : environnement au point 1bis (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 5 : Batcorder 3.0 au point 2 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 6 : environnement au point 2 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 7 : Batcorder 3.0 au point 3 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 8 : environnement au point 3 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 9: batcorder 3.0 au point 4 et son environnement (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 10: batcorder 3.0 au point 5 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 11: batcorder 3.0 au point 6 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 12: environnement au point 6 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 13: batcorder 3.0 au point 7 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 14: environnement au point 7 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 15: mini-Batcorder et de son environnement au point 8 (O-GEO, le 04/06/2020)



Photo. 16: environnement au point 8 (O-GEO, le 04/06/2020)

3 - Parcours

La méthode du parcours consiste à parcourir à pieds l'aire d'étude pour récolter des données sur une plus grande surface que celle occupée par les points d'écoute.

Les parcours prédéfinis ont été mis en place de façon à échantillonner l'ensemble de l'aire d'étude, soit les milieux attractifs et les milieux ouverts (Carte 2, Carte 3).

Le protocole du parcours est réalisé en mettant en place toutes les mesures de sécurité de manière à sécuriser le technicien en charge des relevés.

Ce trajet est effectué à pied et atteint 7,5 km.

Équipé d'un détecteur enregistreur automatique, le technicien parcourt l'aire d'étude durant près de deux heures, à l'issue des 45 minutes écoulées après l'heure du coucher du soleil. Ce délai permet de s'assurer que toutes les espèces de Chiroptères ont bien quitté leur gîte pour arriver sur l'aire d'étude.


4 - Caractérisation des habitats

Une caractérisation des habitats de l'aire d'étude a été fournie par le bureau d'études Dervenn (Carte 4).

Ces données permettent d'analyser l'activité des chiroptères en fonction de l'habitat le plus proche et plus particulièrement d'évaluer l'activité en lisière de milieux attractifs (boisements, haies, fourrés). Ces milieux sont dits attractifs puisqu'ils permettent aux chauves-souris de se nourrir et de s'abriter. Ils sont donc d'une importance cruciale pour l'activité des Chiroptères.

Ce sont 15 types de milieux qui ont été référencés sur le site en 2019 (source : Axe via Dervenn) :

- Carrière
- Boisement mixte
- Boisement de Conifères
- Boisement de Conifères sur friche
- Friche
- Haie
- Landes mésophile à Ajonc de le Gall et Bruyère
- Lande sèche
- Mégaphorbie à Œnanthe safranée
- Mosaïque de roselières et de saussaie
- Plan d'eau
- Prairie mésophile
- Roselière
- Sausaie
- Terrain cultivé



Carte 4 : cartographie des habitats en 2019 (source : AXE via Dervenn)

5 - Durée cumulée de l'écoute de l'activité des Chiroptères

Au niveau des points d'écoute, l'appareil est configuré de manière à se déclencher avant le coucher du soleil et à s'arrêter après son lever. Ainsi, la période de fonctionnement de l'appareil englobe la phase nocturne.

Au niveau du parcours, l'appareil est allumé au départ et est éteint à la fin.

Au total, l'étude s'appuie sur (Tableau 1) :

- 6,3 heures d'écoutes réparties sur un parcours et trois sessions ;
- 198 heures d'écoute réparties sur 8 points et trois sessions.


Au point 6, durant la seconde session, un dysfonctionnement de l'appareil n'a pas permis de récupérer les enregistrements.

Date	Point	Détecteur		Soleil		Durée du fonctionnement (en heure)	Durée de la nuit (en heure)	Durée de l'écoute nocturne (en heure)
		Début	Fin	Coucher	Lever			
04/06/2020	Parcours	22:53	01:09	22:03	06:16	2,26	8,21	2,26
02/07/2020	Parcours	23:07	01:10	22:12	06:20	2,04	8,13	2,04
26/08/2020	Parcours	21:58	23:58	21:03	07:24	2,00	10,35	2,00
Total						6,3	26,7	6,3
04/06/2020	Pt 1	21:36	06:46	22:03	06:16	9,16	8,21	8,21
	Pt 2	21:37	06:46	22:03	06:16	9,15	8,21	8,21
	Pt 3	21:37	06:46	22:03	06:16	9,15	8,21	8,21
	Pt 4	21:37	06:46	22:03	06:16	9,15	8,21	8,21
	Pt 5	22:53	01:09	22:03	06:16	2,26	8,21	2,26
	Pt 6	21:37	06:46	22:03	06:16	9,15	8,21	8,21
	Pt 7	21:37	06:46	22:03	06:16	9,15	8,21	8,21
	Pt 8	19:01	08:09	22:03	06:16	13,14	8,21	8,21
02/07/2020	Pt 1bis	21:40	06:30	22:12	06:19	8,83	8,13	8,13
	Pt 2	21:40	06:30	22:12	06:20	8,83	8,13	8,13
	Pt 3	23:23	08:13	22:12	06:19	8,83	8,13	6,95
	Pt 4	21:30	06:30	22:12	06:20	9,00	8,13	8,13
	Pt 5	21:40	06:30	22:12	06:20	8,83	8,13	8,13
	Pt 7	18:54	08:50	22:12	06:20	13,94	8,13	8,13
	Pt 8	19:51	07:48	22:12	06:20	11,96	8,13	8,13
26/08/2020	Pt 1bis	20:40	07:45	21:03	07:24	11,08	10,35	10,35
	Pt 2	20:40	07:45	21:03	07:24	11,08	10,35	10,35
	Pt 3	18:38	08:12	21:03	07:24	13,57	10,35	10,35
	Pt 4	20:40	07:45	21:03	07:24	11,08	10,35	10,35
	Pt 5	20:40	07:45	21:03	07:24	11,08	10,35	10,35
	Pt 6	18:16	07:53	21:03	07:24	13,61	10,35	10,35
	Pt 7	20:40	07:45	21:03	07:24	11,08	10,35	10,35
	Pt 8	19:34	07:28	21:03	07:24	11,89	10,35	10,35
Total						235,00	205,40	198,28
Total						241,30	232,09	204,58


Tableau 1 : durée de l'écoute de l'activité des Chiroptères et de la phase nocturne

6 - Conditions météorologiques


Les conditions météorologiques sont favorables, par l'absence de vent fort, l'absence de pluie et une température supérieure ou proche de 12°C en début de nuit. Cette température est stable durant la première et la troisième session (Graph. 1, Graph. 3). Durant la seconde session, la température est progressivement descendue, se maintenant à plus de 8°C. Si ce niveau de température n'empêche pas l'activité, elle peut la limiter. Au demeurant, les résultats montreront que les Chiroptères étaient bien présents durant cette nuit d'écoute.



Graph. 1 : évolution de la température durant la session du 04/06/2020



Graph. 2 : évolution de la température durant la session du 02/07/2020



Graph. 3 : évolution de la température durant la session du 27/08/2020

C - Matériel de détection, d'enregistrement et d'analyse

1 - Matériel de détection et d'enregistrement

Les modèles Batcorder 3.0, mini-batcorder sont utilisés pour cette étude. À chaque détection d'émission ultrasonore, et en fonction de seuils paramétrés, l'appareil génère un fichier horodaté. En fin de nuit, un fichier liste l'ensemble des séquences enregistrées, les heures de démarrage et d'arrêt de l'appareil et les seuils de paramétrage.

Sur les points d'écoute, les appareils sont paramétrés sur un standard de seuils de déclenchement d'enregistrement des signaux.

Compte-tenu de la plus faible durée consacrée aux parcours, les seuils de déclenchement d'enregistrement des signaux sont accentués de manière à capter un maximum de signaux. Cela implique un risque de perte de qualité des signaux et par conséquent une limitation de la possibilité d'identifier l'espèce. Cela engendre aussi un grand nombre de séquences parasites qui augmentent significativement le temps d'analyse.

2 - Logiciel d'identification des séquences

Le logiciel batIdent permet d'attribuer une, deux, trois espèces ou groupes d'espèces pour chaque séquence. Un taux de probabilité d'identification automatique est apporté à chaque détermination.

Le logiciel BcAnalyze3 propose oscillogramme, spectrogramme, spectre d'énergie et écoute en expansion de temps.

3 - Logiciel de traitement des séquences

Ce logiciel permet de gérer l'ensemble des séquences et de préciser les conditions d'enregistrement de chaque session. Ce logiciel assure le traitement des séquences une fois l'identification automatique effectuée. Le contrôle est facilité par une prévisualisation des signaux. Dans le cas où une séquence demande à être analysée précisément, l'interface ouvre le programme BcAnalyze3 de manière à étudier le signal plus finement. Le nom attribué automatiquement à une séquence peut être rapidement précisé voire corrigé à partir d'une liste prédéfinie, elle-même modifiable. Les données sont exportables pour développer l'analyse sur des tableurs.

D - Matériel de géoréférencement des séquences sur parcours

Une application installée sur Smartphone équipé d'un système de géolocalisation enregistre toutes les secondes la position du technicien.

E - Détermination des taxons

La détermination des taxons s'appuie sur l'analyse acoustique des séquences.

Nous suivons l'ordre de la procédure décrite ci-dessous :

- 1 : lancement de l'identification automatique (par le logiciel BatIdent)
- 2 : prévisualisation des signaux pour contrôler l'ensemble des séquences et valider l'identification à fort taux de probabilité (essentiellement pour la Pipistrelle commune, la Barbastelle, le Grand Rhinolophe, les Noctules en transit, etc.)
- 3 : en cas de doute ou de non détection d'une autre espèce, la séquence est analysée sur BcAnalyze3, voire écoutée pour identifier avec certitude le taxon ou le groupe taxonomique :
 - o En cas d'identification automatique de certaines espèces comme les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, le Vesper de Savi, les Noctules et Sérotine en chasse, les Oreillards et l'ensemble des murins, la séquence est aussi analysée ;
 - o Pour ces analyses complémentaires nous suivons la méthode d'identification développée par Michel Barataud (BARATAUD M., 2012)¹ ;
- 4 : validation et/ou correction du nom du taxon ou du groupe correspondant à la séquence analysée.

¹ BARATAUD, 2012. Écologie acoustique des Chiroptères d'Europe. Identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements de chasse

Nous rappelons que la détermination des espèces à partir de l'analyse d'une séquence souffre de certaines limites.

Dans le meilleur des cas, nous attribuerons avec certitude le nom d'une espèce à une séquence. Dans d'autres cas, un doute subsiste et donc notre niveau de certitude passe au probable voire au possible.

Lorsque la diagnose ne permet pas d'associer un nom d'espèce à une séquence, nous attribuons un nom de groupe taxinomique à celle-ci. Cela se produit quand les animaux évoluent dans un milieu qui implique d'utiliser un type de signal adapté, on parle alors de convergence de comportement acoustique des Chauves-souris. Nous restons aussi au niveau du groupe taxinomique quand elles utilisent des signaux similaires mais dans un environnement différent. Dans ce dernier cas, les milieux sont trop proches les uns des autres à l'échelle du point d'écoute. L'enregistrement « *passif* » ne permet pas de savoir si l'espèce s'aventure dans l'un ou l'autre des milieux quand ces signaux sont enregistrés. Ne pouvant associer le type de signal avec le type de milieu, nous ne pouvons aboutir à une identification précise de l'espèce.

F - Traitement des données

1 - De l'enregistrement à la séquence puis au contact

Chaque enregistrement est analysé pour aboutir à la détermination d'une ou de plusieurs espèces. Dans certains cas, un enregistrement est généré par le passage de plusieurs espèces (exemple : si un fichier enregistre 3 espèces, il apporte 3 séquences). Par conséquent, un enregistrement peut générer une à plusieurs séquences.

Un même passage de Chauves-souris peut générer plusieurs séquences mais sur une période très courte ; de quelques secondes. Pour éviter ce biais qui peut induire un niveau d'activité supérieur, nous considérons qu'un contact est le fait d'un passage d'une chauve-souris durant une période de 5 secondes. Ainsi une séquence d'une durée supérieure à 5 secondes peut générer plusieurs contacts. À l'inverse, plusieurs séquences peuvent générer un seul contact si le cumul de celles-ci ne dépasse pas les 5 secondes.

En fonction des problématiques étudiées, comparer les niveaux d'activité entre espèce s'avère pertinent. Cependant, la capacité de détecter une espèce est tributaire de sa puissance d'émission. Certaines espèces comme les Noctules ont des cris très puissants qui peuvent être captés jusqu'à une centaine de mètres. Pour d'autres espèces comme les Rhinolophes, cette distance est de l'ordre de quelques mètres. Par conséquent, appliquer un coefficient de correction peut s'avérer pertinent. Nous proposons dans ce cas une correction de l'indice d'activité en nombre de contacts ou en nombre de contacts par heure qui s'appuie sur les coefficients de détectabilité publié par Michel Barataud (Barataud M., 2012)¹.

2 - Géolocalisation des séquences

Chaque séquence, à l'aide d'un fichier gpx, est automatiquement géoréférencée par le logiciel bcAdmin.

3 - Évaluation d'indice d'activité par point d'écoute

Nous utilisons le cumul du nombre de contacts, ramenés à l'heure, comme indice d'activité. La détection d'une chauve-souris sur une durée de 5 secondes est considérée comme un contact.

a - Analyse par taxon

Pour certains taxons comme la Pipistrelle commune, la Barbastelle d'Europe ou le Grand Rhinolophe, l'identification est en général aisée ce qui permet d'attribuer un indice d'activité spécifique.

Pour les autres espèces, le niveau de certitude quant à la distinction d'une espèce, parmi un ensemble de plusieurs autres espèces de Chauves-souris, peut être soit certain, soit probable, soit possible. Dans d'autres, la discrimination est impossible. Ainsi, même si des séquences permettent de distinguer une espèce, d'autres ne permettent pas de la dissocier d'un ou plusieurs autres taxons. Par conséquent, considérer les séquences aboutissant à une distinction spécifique en occultant celles qui ne le permettent pas revient à sous-estimer un indice d'activité.

Dès lors, il devient plus judicieux de réaliser des analyses par groupes taxinomiques.

b - Analyse par groupe

Si la distinction entre plusieurs taxons est délicate voire impossible, il n'en demeure pas moins que nous devons intégrer cette activité.

Pour cela, nous utilisons un indice d'activité regroupant un ensemble d'espèces ou de groupe d'espèces dont les caractéristiques acoustiques sont similaires. Ces groupes comportent alors chacun un ensemble de genre spécifique :

- Les Pipistrelloïdes : toutes les espèces de Pipistrelles et le Minioptère de Schreibers ;
- Les Nyctaloïdes : les Sérotines et les Noctules ;
- Les Murins : toutes les espèces de Murin ;
- La Barbastelle : la Barbastelle d'Europe ;
- Les Oreillards : l'Oreillard roux et l'Oreillard gris ;
- Les Rhinolophes : toutes les espèces de Rhinolophe.

Pour faciliter l'analyse des niveaux d'activités, nous regroupons dans certains cas les Murins, la Barbastelle, les Oreillards et les Rhinolophes.

G - Analyse de l'activité

1 - Liste des espèces inventoriées

Dans un premier temps l'analyse de l'activité des Chiroptères décrit le peuplement inventorié à travers :

- Une liste d'espèce, ou de groupe d'espèces quand la diagnose n'a pas permis d'associer une séquence à une seule espèce ;
- Un tableau de synthèse des nombres de contacts enregistrés par espèce sur chaque point d'écoute ou durant chaque session si le nombre de points d'écoute est limité ;
- Un graphique de distribution du nombre de contacts par espèce qui permet d'identifier les espèces disposant le plus de contacts de celles moins actives à anecdotiques.

2 - Activité à l'échelle du peuplement

À ce niveau, l'activité est analysée à l'échelle de l'aire d'étude. Elle s'appuie sur la comparaison pour chaque espèce :

- Du pourcentage de points d'écoute signalant chacune d'entre-elles :
 - o Espèces communes : 75 à 100 % des points d'écoute ;
 - o Espèces moyennement communes : 50 à 75 % des points d'écoute ;
 - o Espèces peu communes : 25 à 50 % des points d'écoute ;
 - o Espèces localisées : < 25 % des points d'écoute.
- Du nombre moyen de contacts par nuit, tous points confondus, qui évoque différents niveaux d'activité :
 - o Élevé : plusieurs centaines de contacts par nuit en moyenne ;
 - o Moyen : plusieurs dizaines de contacts par nuit en moyenne ;
 - o Faible : quelques contacts par nuits ;
 - o Très faible : moins d'un contact par nuit (espèce non contactée à chaque session par exemple).

3 - Activité spécifique

Pour chaque espèce, nous reprenons :

- Le nombre moyen de contacts par nuit pour chaque point d'écoute ;
- Le profil de l'activité au cours de chaque session :
 - o En période estivale ;
 - o En période automnale si l'étude intègre ces relevés.

Ce niveau d'analyse permet de préciser les niveaux d'activité identifiés à l'échelle de l'aire d'étude. Il apporte aussi des informations importantes sur :

- Les phénomènes d'émergence de début et/ou de fin de nuit, qui annoncent la présence d'un gîte à proximité du point d'écoute ;
- La fréquentation de l'environnement de chaque point d'écoute, fréquentation qui peut être :

- Continue ;
- Régulière ;
- Irrégulière ;
- Ponctuelle.

Ainsi, dans certain cas, le niveau d'activité peut être moyen à faible, mais la présence régulière au cours de la nuit indique par exemple que l'espèce exploite le secteur étudié pour son alimentation.

4 - Activité le long du parcours et influence des habitats au sein de l'aire d'étude

Chaque parcours est défini en nombre de points répartis uniformément le long de ce dernier grâce au logiciel de cartographie QGIS.

Ainsi, l'analyse s'appuie sur un ensemble de 2 079 données.

Sessions	N données (points)
04/06/2020	725
02/07/2020	682
26/08/2020	672
Total	2079

À chaque point sont associés :

- La présence ou non d'un contact de Chiroptères ;
- Le type d'habitat le plus proche (source : Axe via Dervenn).

Pour bénéficier d'un nombre de données contacts suffisant, l'analyse est réalisée sur l'ensemble des contacts générés, toutes espèces confondues.

Afin de s'assurer du caractère significatif de l'effet des différents milieux sur l'activité des Chiroptères et des types de lisière en particulier, une série de test (Loi normale, homoscedasticité, Mann-Whitney, Wilcoxon, Test de Student) sont appliqués à l'ensemble des données parcours pour étudier leur distribution en fonction de la distance à la lisière et de l'absence/présence de contacts.

II - RÉSULTATS

A - Liste des espèces inventoriées

S'appuyant sur 198 heures d'écoute nocturne sur point et 6,3 heures d'écoute nocturne sur parcours, sur 8 points et 1 parcours de 7,5 km, l'étude de l'activité des Chiroptères a permis de collecter 22 506 séquences. Elles apportent au total 26 763 séquences-espèces. La compilation de ces séquences aboutit à un total de 20 333 contacts dont 790 le long du parcours et 20 333 sur les points d'écoute (Tableau 3, Tableau 3).

Au total, 16 espèces de Chiroptères sont inventoriées au cours de la session du mois de mai 2020 :

- La Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber - 1774) ;
- La Pipistrelle de Kuhl	<i>Pipistrellus kuhlii</i> (Kuhl - 1817) ;
- La Pipistrelle de Nathusius	<i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius - 1839) ;
- La Pipistrelle pygmée	<i>Pipistrellus pygmaeus</i> (Leach - 1825) ;
- La Sérotine commune	<i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber - 1774) ;
- La Noctule commune	<i>Nyctalus noctula</i> (Schreber - 1774) ;
- La Noctule de Leisler	<i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl - 1817) ;
- Le Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i> (Kuhl - 1817) ;
- Le Murin de Natterer	<i>Myotis nattereri</i> (Kuhl - 1817) ;
- Le Murin de Bechstein	<i>Myotis bechsteinii</i> (Kuhl - 1817) ;
- Le Murin d'Alcathoe	<i>Myotis alcathoe</i> Helversen & Heller – 2001 ;
- Le Murin à moustaches	<i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl - 1817) ;
- L'Oreillard gris	<i>Plecotus austriacus</i> (J.B. Fischer - 1829) ;
- L'Oreillard roux	<i>Plecotus auritus</i> (Linnaeus - 1758) ;
- La Barbastelle d'Europe	<i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber - 1774) ;
- Le Grand rhinolophe	<i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber - 1774).

La diagnose est parfois délicate entre certaines espèces. C'est en premier lieu le cas des séquences de Murin. Le niveau de certitude varie entre possible, probable et certain. Pour plusieurs séquences, les espèces n'ont d'ailleurs pas pu être identifiées.

Certaines séquences ne présentaient pas de caractéristiques suffisamment discriminantes pour dissocier les espèces de Noctules et de Sérotine. Un signal n'a pu être associé à une espèce.

Famille	Nom vernaculaire	Parcours			Total
		2020-06-04	2020-07-02	2020-08-26	
Vespertilionid	Pipistrelle commune	176	176	296	648
	Pipistrelle de Kuhl	22	26	43	91
	Sérotine commune		33		33
	Noctule de Leisler	1	3		4
	Murin de Daubenton	3	2	1	6
	Oreillard gris		5		5
	Barbastelle d'Europe	1		1	2
Rhinolophidae	Grand rhinolophe	1			1
Total		245	204	204	245
N espèces		6	6	4	8

Tableau 2 : liste des espèces de Chiroptères répertoriées le long du parcours et nombre de contacts par point et par session

		Pt 1	Pt 1bis	Pt 2			Pt 3			Pt 4			Pt 5			Pt 6			
Famille	Nom vernaculaire	2020-06-04	2020-07-02	2020-08-26	2020-07-02	2020-06-04	2020-08-26	2020-07-02	2020-06-04	2020-08-26	2020-07-02	2020-06-04	2020-08-26	2020-07-02	2020-06-04	2020-08-26	2020-06-04	2020-08-26	
Vespertilionidae	Pipistrelle commune	139	98	411	155	748	470	328	374	336	33	31	66	299	108	330	33	1525	
	Pipistrelle de Kuhl	26	13	61	6	122	58	80	90	83	6	2	16	8	3	13	4	125	
	Pipistrelle de Nathusius	3	1	1		23		9	21			1			1		1	1	
	Pipistrelle pygmée											1							
	Sérotine commune	2	4	4	5			24	1		10			1		2			
	Noctule de Leisler		3	3	1		1	8	2		5		3		1			3	
	Noctule commune							2			2								
	Murin de Daubenton					1					1	1	3	4	5		1	8	
	Murin de Natterer	4			1														
	Murin à moustaches			1	1		1											1	
	Murin de Bechstein						1												
	Murin d'Alcathoe															2			
	Murin indéterminé					1												2	
	Barbastelle d'Europe	1			5	6	12	1	2					1			5		1
	Oreillard gris	1	3	1	4	1	5	7		1	80	3	5	4			11		3
Oreillard roux																7			
Oreillard indéterminé						1													
Rhinolophidae	Grand rhinolophe	1		1				1		2				1					
Total		177	122	483	178	902	549	460	490	422	137	39	94	317	118	370	39	1669	
N espèces		8	6	8	8	6	7	9	6	4	7	6	6	6	5	7	4	8	


Famille	Nom vernaculaire	Pt 7			Pt 8			Total
		2020-07-02	2020-06-04	2020-08-26	2020-07-02	2020-06-04	2020-08-26	
Vespertilionidae	Pipistrelle commune	3172	2148	3549	163	54	103	14673
	Pipistrelle de Kuhl	2823	1114	242	5	4	6	4910
	Pipistrelle de Nathusius	1	4	1		1		69
	Pipistrelle pygmée		1					2
	Sérotine commune							53
	Noctule de Leisler			2				32
	Noctule commune	1						5
	Murin de Daubenton	88	3	262				377
	Murin de Natterer		1				1	7
	Murin à moustaches			3				7
	Murin de Bechstein						1	2
	Murin d'Alcathoe							2
	Murin indéterminé							3
	Barbastelle d'Europe			2	1			37
	Oreillard gris		2	2			1	134
	Oreillard roux			1				8
	Oreillard indéterminé							1
Rhinolophidae	Grand rhinolophe			1			4	11
Total		6085	3273	4065	169	59	116	20333
N espèces		5	7	10	3	3	6	16

Tableau 3 : liste des espèces de Chiroptères répertoriées sur les points d'écoute et nombre de contacts par point et par session

Concernant les points d'écoute, les contacts se répartissent majoritairement entre la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl (96,3%, Graph. 5).

Les nombreuses autres espèces ne produisent qu'un nombre restreint de contacts (3,7%), ce qui représente au demeurant 750 contacts. Dans ce cortège, le Murin de Daubenton se démarque, et dans une moindre mesure l'Oreillard gris, puis la Pipistrelle de Nathusius, La Sérotine commune, la Barbastelle d'Europe et la Noctule de Leisler (Graph. 4).

Les autres espèces ne génèrent que quelques contacts.




Graph. 4 : proportion des contacts générés par les Chiroptères sur les points d'écoute (hors Pipistrelles commune et Pipistrelle de Kuhl)

Concernant le parcours, les contacts sont majoritairement générés par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl (93,6%, Graph. 6).


La Sérotine commune est la troisième espèce la plus contactée. Les autres espèces, la Noctule de Leisler, la Murin de Daubenton, la Barbastelle d'Europe et l'Oreillard gris sont détectées dans faibles et équivalentes proportions.

Le peuplement répertorié à travers le parcours est nettement moins diversifié. Le parcours cumule seulement 6,3 heures alors que les points d'écoute cumulent 198 heures. La durée du parcours correspond à 3,2 % de la durée des points d'écoute. Cette contrainte peut expliquer à ce stade de l'étude une absence ou une faible représentation du cortège d'espèces répertoriées sur les points d'écoutes.

En dehors de la Pipistrelle de Nathusius qui est absente du parcours, l'ensemble des espèces répertoriées le long du parcours sont celles qui se démarquent dans les relevés sur point d'écoute par la proportion de leurs contacts.



Graph. 5 : répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères récoltés le protocole points d'écoute



Graph. 6 : répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères récoltés le protocole parcours


B - Activité des Chiroptères

1 - À l'échelle du peuplement chiroptérologique


a - Niveau de présence

Différents niveaux de présence sont caractérisés par un taux de couverture des points d'écoute et un nombre de contacts par nuit (Graph. 7) :

- Espèces très communes (75 à 100% des points d'écoute) :
 - o Avec un niveau moyen d'activité élevé :
 - La Pipistrelle commune ;
 - La Pipistrelle de Kuhl ;
 - o Avec un niveau moyen d'activité faible :
 - Oreillard gris ;
 - Pipistrelle de Nathusius ;
 - Barbastelle d'Europe ;
 - Noctule de Leisler ;
- Espèces communes (50 à 75 % des points d'écoute) :
 - o Avec un niveau moyen d'activité faible à moyen :
 - Murin de Daubenton ;
 - o Avec un niveau moyen d'activité faible :
 - Sérotine commune ;
 - o Avec un niveau moyen d'activité très faible :
 - Grand rhinolophe ;
- Espèces peu communes (25 à 50 % des points d'écoute) :
 - o Avec un niveau d'activité très faible :
 - Murin de Natterer ;
 - Murin à moustaches ;
 - Noctule commune ;
- Espèces localisées (moins de 25% des points d'écoute) :
 - o Avec un niveau moyen d'activité très faible :
 - Oreillard roux ;
 - Pipistrelle pygmée ;
 - Murin de Bechstein ;
 - Murin d'Alcathoe.



Graph. 7 : taux de couverture des points d'écoute et niveau moyen d'activité pour chaque espèce ou taxon



Graph. 8 : niveaux de diversité et d'activité en fonction des points d'écoute

b - Diversité et densité par point

La diversité oscille entre 8 et 13 espèces par point d'écoute (Graph. 8).

Le point 7 situé le long d'une lagune affiche la plus grande diversité et un niveau d'activité moyen sans aucune mesure avec les autres points d'écoute. L'hypothèse de l'attractivité des points d'eau au sein de la carrière est avancée.


Concernant les autres points, la diversité oscille entre 8 et 11 contacts, mais pour un niveau moyen d'activité qui n'est pas corrélé. Le point 6, situé le long d'un alignement de pin à proximité d'une fosse en eau, affiche le niveau d'activité le plus élevé mais pour une diversité des plus basses.

Le point 4, situé en lisière d'un cordon relictuel de Pinède donnant sur une large piste affiche le niveau moyen d'activité le plus faible mais pour une diversité supérieure atteignant 10 espèces.

Les points 2 et 5, respectivement situés en lisière boisée donnant sur une culture ou au milieu de fourré non loin d'un Pinède affiche un niveau de diversité supérieur, avec 11 espèces pour un niveau moyen d'activité intermédiaire.

Corrélé l'activité cumulée avec la diversité n'est pas possible entre autres parce que la Pipistrelle commune influence directement les niveaux d'activité (coef. de corrélation = 0,997). Ce coefficient de corrélation est aussi très élevé pour la Pipistrelle de Kuhl et le Murin de Daubenton. Ces trois espèces expriment un intérêt similaire pour chaque point d'écoute.

Les autres espèces n'expriment pas le même intérêt.



Graph. 9 : niveaux d'activité en fonction des points d'écoute et des espèces

c - Diversité et densité le long du parcours

D'une session à une autre les Chiroptères sont présents entre 14% et 23% du parcours (Graph. 10). Sur l'ensemble des données, ils couvrent 19% du parcours. Par conséquent, les Chiroptères ne sont pas présents sur l'ensemble de l'aire d'étude mais se localisent à certains secteurs.


Au niveau des espèces, la Pipistrelle commune atteint des proportions similaires, respectivement 17% (Graph. 11). Dominant l'activité sur l'ensemble des points d'écoute, cette tendance est cohérente.

La Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune couvrent une proportion nettement plus faible des données (2,3% et 0,8%, Graph. 11). Concernant le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler, l'Oreillard gris, la Barbastelle d'Europe et le Grand Rhinolophe, les données sont très limitées.


Le parcours traverse ou longe différents habitats. Ainsi, contrairement aux points d'écoute, la probabilité de contacter des espèces sur l'ensemble ou la majorité de son tracé est fortement diminuée, particulièrement en l'absence d'habitats attractif sur certains secteurs. Ainsi les espèces très communes ou communes sur les points d'écoute situés en milieu attractif sont localisées le long du parcours, voire absente comme la Pipistrelle de Nathusius.

La carte suivante (Carte 5) affiche la répartition des contacts le long du parcours et le nombre d'espèces associé au nombre moyen de contacts par nuit au niveau des points d'écoute. Les contacts se répartissent visiblement le long du parcours particulièrement à proximité d'habitats attractifs : lagune, fosse en eau, Pinède, fourré. Ils sont nettement plus rares dans les espaces ouverts (fond blanc sur la vue aérienne).


Au demeurant, tous les secteurs de Pinède n'affichent pas de contacts, parfois ces derniers sont absents sur de longues distances, parfois sont discontinus. La concentration des points à proximité des lagunes et des fosses du centre de l'aire d'étude et au sud est remarquable. Une tendance de forte attractivité des points d'eau se confirme à nouveau.



Graph. 10 : distribution de la présence des Chiroptères le long du parcours



Graph. 11 : distribution des proportions pondérées de mailles-tronçon-parcours en fonction de la présence de Chiroptères et du linéaire de haie



Carte 5 : localisation des contacts de toutes les espèces de Chiroptères


d - Analyse de l'influence des habitats le long du parcours

La terminologie des habitats reprend celle fournie dans la cartographie fournie par le bureau d'étude Dervenn.


L'analyse statistique met en évidence une attractivité significative des boisements (Graph. 12, comprenant conifères et mixtes) et des habitats de type friche selon la cartographie fournie, associé aux fourrés dans cette étude (Graph. 13).

L'attractivité des landes sèches et les roselières sont également significatives (Graph. 14, Graph. 15). Les nombre de données très limité pour la première, et le peu d'écart de distance entre les tendances pour le deuxième invitent à modérer la pertinence des résultats du test.


L'attractivité es plans d'eau est non significative. En effet, les données ne signalant pas de contact et celles les signalant se situent dans un même niveau de distance, concentrées entre 5 et 10 m (Graph. 16). De fait, les tendances ne peuvent être distinguées. Cependant, le nombre de données signalant des contacts est nettement supérieur à celui n'en signalant pas, témoignant tout de même de l'attractivité du milieu aquatique.




Graph. 12 : distribution des points parcourus en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière de boisements




Graph. 13 : distribution des points parcourus en fonction de la présence de contacts et de la distance aux friches



Graph. 14 : distribution des points parcourus en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière des landes sèches



Graph. 15 : distribution des points parcourus en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière des roselières



Graph. 16 : distribution des points parcourus en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière des plans d'eau

e - Profil journalier de l'activité par point

Le graphique suivant permet d'identifier l'évolution de l'activité moyenne cumulée des Chiroptères au niveau de chaque point.

Durant la session estivale, l'activité est continue ou quasi continue aux points 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 (Graph. 17). Elle est nettement plus forte au point 7, marquée d'un pic en début de nuit et plus faiblement en fin de nuit. Elle est plus équilibrée entre les autres points, un peu plus marquée en début de nuit aux points 2 et 3. L'activité est continue en début de nuit puis régulière au point 1bis. Elle se concentre essentiellement en début de nuit au point 6.


Ainsi, l'ensemble des points est fréquenté soit durant toute la nuit, soit durant la première partie de la nuit. Les niveaux moyens d'activité sont produits par une activité globalement continue.

L'activité émerge entre 10 et 20 minutes aux points 1, 2 et 3, entre 20 et 30 minutes aux points 4, 6 et 8. Ces émergences évoquent la présence d'un gîte à proximité de ces points en période estivale.


Durant la session automnale, l'activité est continue ou quasi continue au point 1bis, 2, 3, 5, 6 et 7 (Graph. 18). À nouveau plus marquée au point 7, elle est aussi importante au point 6. Sur l'ensemble de ces points, l'activité est plus intense dans le premier tiers de la nuit. Le point 7 affiche à nouveau un pic d'activité en début et en fin de nuit. Au niveau des points 4 et 8, l'activité est nettement plus faible, continue dans la première moitié de la nuit puis régulière.

Ainsi, comme pour les sessions estivale, l'ensemble des points est exploité soit durant toute la nuit, soit durant la première partie de la nuit. Les niveaux moyens d'activité sont générés par la concentration de l'activité sur ces périodes de la nuit, à nouveau accentuée au point 1.

L'activité émerge entre 10 et 20 minutes après le coucher du soleil au point 3, puis entre 20 et 30 minutes aux points 1, 2, 4, 5 et 6. La présence d'un gîte est envisagée à proximité de ces points d'écoute.



Graph. 17 : évolution de l'activité moyenne des Chiroptères durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Graph. 18 : évolution de l'activité moyenne des Chiroptères durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute

2 - À l'échelle des espèces

a - Les espèces très communes

Nous qualifions de très communes, les espèces présentes sur l'ensemble des points d'écoute.

i - La Pipistrelle commune

La Pipistrelle commune est une espèce anthropophile. Elle affectionne très largement le bâti où elle trouve des cavités nécessaires à ses phases d'inactivité en journée en période estivale, pour ses nurseries ou des individus isolés. Elle s'accommode aussi des fissures dans les murs et autres interstices dans les bâtiments.


Cette espèce est très commune sur l'aire d'étude, présente sur l'ensemble des points. Elle domine aussi largement l'activité par point (72% des contacts, Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). C'est aussi l'espèce la plus souvent contactée dans les relevés parcours (Carte 7, Graph. 11).

Durant les sessions estivales, l'activité de la Pipistrelle commune est continue aux points 2, 3, 7 et 8 avec une intensité nettement supérieure au point 7 (Graph. 19). Au point 1, 1bis et 4, l'activité est continue ou quasi continu en première moitié de nuit, puis après une absence ou après quelques apparitions ponctuelles, sa présence est continue en fin de nuit. Cette tendance à une activité plus forte en début de nuit et un regain en fin de nuit est généralisée à l'ensemble des points d'écoute sans pour autant avoir d'explication.


Son activité crépusculaire se manifeste aux points 1, 2 et 3 entre 10 et 20 minutes après le coucher du soleil, et aux points 4, 6 et 8 entre 20 et 30 minutes. Ce comportement crépusculaire évoque la présence d'un gîte anthropique à proximité de ces points d'écoute.

Durant la session automnale, l'activité est similaire à celle décrite à l'échelle du peuplement (Graph. 20). Cela témoigne de la forte influence de l'activité de la Pipistrelle commune à l'échelle du peuplement.


L'activité émerge entre 10 et 20 minutes après le coucher du soleil au point 3, puis entre 20 et 30 minutes aux points 1, 2, 4, 5 et 6. La présence d'un gîte est envisagée à proximité de ces points d'écoute.



Graph. 19 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle commune durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Graph. 20 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle commune durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute



Carte 6 : localisation de l'activité de la Pipistrelle commune

ii - La Pipistrelle de Kuhl

La Pipistrelle de Kuhl est une espèce anthropophile. Elle affectionne très largement le bâti. Elle y trouve des cavités nécessaires pour ses nurseries ou les individus isolés en période estivale, voire en période hivernale.

Cette espèce est aussi très commune et active, cumulant 24% des contacts au niveau des points (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). Elle est la seconde espèce contactée le long du parcours (Graph. 11). Sa répartition est moins dense que celle de la Pipistrelle commune. Les contacts en milieu ouvert, éloignés des Pinèdes et points d'eau sont rares (Carte 7).


Durant les sessions estivales, l'espèce affiche une activité quasi continue au point 2, mais à un niveau relativement faible (Graph. 21). Elle est continue ou quasi continue en première moitié de nuit et réapparaît en fin de nuits aux points 3 et 7. Mais le point 7 à nouveau affiche le plus grand niveau d'activité. La Pipistrelle de Kuhl est essentiellement active en début de nuit aux points 1, 1bis, 4, 5 et 8. Elle ne fait qu'une apparition en début de nuit au point 4.

L'espèce fréquente de manière différente les points d'écoutes sans explication particulière, si ce n'est une certaine affection pour le milieu aquatique.


Elle apparaît entre 20 et 30 minutes après le coucher du soleil aux points 1bis, 2 et 3. Cette émergence crépusculaire évoque la proximité d'un gîte anthropique dans le secteur nord-est.

Dans la session automnale, l'espèce est active en début de nuit sur la majorité des points (Graph. 22). Elle apparaît ponctuellement en début de nuit au point 8. Elle réapparaît de manière continue en fin de nuit aux points 3 et 7. Sur les autres points, le reste de la nuit, sa présence est régulière (point 1bis) ou ponctuelle (point 2, 4, 5 et 6).


Elle apparaît entre 20 et 30 minutes après le coucher du soleil aux points 1bis, 2, 3 et 4. Cette émergence crépusculaire évoque la proximité d'un gîte anthropique dans le secteur nord-est.



Graph. 21 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle de Kuhl durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Graph. 22 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle de Kuhl durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute



Carte 7 : localisation de l'activité de la Pipistrelle de Kuhl


iii - L'Oreillard gris

Espèce nettement anthropophile, les colonies estivales de l'Oreillard gris affectionnent particulièrement les combles des bâtiments, mais aussi dans les espaces créés entre les linteaux de vieilles ouvertures de bâtiments.

Contactée sur la moitié des points, l'espèce affiche un niveau moyen d'activité faible (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). Le long du parcours, elle n'apparaît qu'à quelques reprises (Graph. 11 Graph. 6, Carte 8).

Durant les sessions estivales, l'espèce apparaît une à quelques reprises dans la nuit sur la majorité des points (Graph. 23), plus particulièrement en début de nuit. Sa présence est marquée au point 4, au centre nord de l'aire d'étude, où l'espèce a concentré son activité dans le premier tiers de la nuit,


Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique.




Graph. 23 : évolution de l'activité moyenne de l'Oreillard gris durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute

Durant la session automnale, l'Oreillard gris apparaît ponctuellement à raison d'un à quelques contacts dans la nuit sur l'ensemble des points d'écoute (Graph. 24).

Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique.



Graph. 24 : évolution de l'activité moyenne de l'Oreillard gris durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Carte 8 : localisation de l'activité de l'Oreillard gris

iv - La Pipistrelle de Nathusius

La Pipistrelle de Nathusius affectionne les gîtes sylvestres, s'accommodant de fissures et d'autres cavités dans les arbres. Elle peut aussi utiliser les bardages, les joints de dilations, les fentes des constructions. L'espèce met bas essentiellement dans le nord-ouest de l'Europe. Par conséquent, les contacts captés en période estivale sont plus probablement le fait de spécimens mâles. Ces derniers occupent des gîtes soit seuls soit en petits groupes.


La Pipistrelle de Nathusius est contactée sur l'ensemble des points. Elle affiche cependant un niveau d'activité faible (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). L'espèce n'est pas contactée le long du parcours (Carte 9).

L'espèce est essentiellement contactée durant les sessions estivales, seulement à une reprise aux points 1bis, 6 et 7 durant la session automnale.


Durant les sessions estivales, la Pipistrelle de Nathusius apparaît ponctuellement sur la majorité des points (Graph. 25). Elle concentre un peu son activité en début de nuit aux points 2 et 3, et en fin de nuit au point 2.

Contactée entre 20 et 30 minutes après le coucher du soleil au point 3, la présence d'un gîte sylvestre est envisageable.

Au demeurant, l'activité faible évoque une très faible densité de spécimens.



Graph. 25 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle de Nathusius durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Carte 9 : localisation de l'activité de la Pipistrelle de Nathusius


v - La Barbastelle d'Europe

En période estivale, les colonies de cette espèce affectionnent à la fois les cavités dans le bâti et dans les arbres pour constituer ses colonies ou pour s'isoler.

La Barbastelle d'Europe affiche un niveau d'activité faible bien que présente sur la majorité des points (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). Elle n'est pas contactée qu'à deux reprises sur le parcours (Graph. 11, Carte 10).

Durant les sessions estivales, son activité est faible mais régulière au cours de la nuit au point 2 (Graph. 26). Elle apparaît ponctuellement aux points 1bis, 3 et 8. Elle est absente des point 1, 4, 5, 6 et 7.


Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique.



Graph. 26 : évolution de l'activité moyenne de la Barbastelle d'Europe durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute

Durant la session automnale, l'espèce est contactée ponctuellement aux points 4, 5, 6 et 7 (Graph. 27). Au point 2, son activité est régulière en début de nuit, marquée par un léger pic en tout début de nuit.

L'espèce est contactée entre 40 et 50 minutes après le coucher du soleil au point 2. Sortant de son gîte la nuit tombée, cette émergence peut être considérée comme précoce. Un gîte anthropique ou sylvestre est envisageable à proximité du point 2.



Graph. 27 : évolution de l'activité moyenne de la Barbastelle d'Europe durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute



Carte 10 : localisation de l'activité de la Barbastelle d'Europe

vi - La Noctule de Leisler


Les Noctules sont des espèces de hauts vols, chassant plus volontiers au-dessus de la canopée. Elles peuvent ainsi être plus facilement détectables en milieu ouvert qu'en lisière, soit parce qu'elles profitent des horizons dégagés pour chasser un plancton aérien, soit parce que le feuillage en lisière peut limiter leur détection. Les Noctules ont aussi tendance à exploiter des gîtes sylvestres durant tout leur cycle biologique. Elles peuvent au demeurant occuper des cavités dans les bâtiments

La Noctule de Leisler est répertoriée sur la majorité des points d'écoute. Mais son niveau d'activité est faible (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). Elle n'est contactée qu'à 4 reprises le long du parcours dans le centre de l'aire d'étude (Graph. 11, Carte 11).


Durant l'ensemble des sessions, l'espèce est contactée ponctuellement au cours de la nuit sur la majorité des points d'écoute (Graph. 28, Graph. 29).

Elle maintient pendant quelques heures sa présence au point 3 durant la première session (Graph. 28).

Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique durant les deux périodes d'étude.



Graph. 28 : évolution de l'activité moyenne de la Noctule de Leisler durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Graph. 29 : évolution de l'activité moyenne de la Noctule de Leisler durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute



Carte 11 : localisation de l'activité de la Noctule de Leisler

b - Les espèces communes

Nous qualifions de communes, les espèces présentes sur 50 à 75% des points d'écoute.

i - Le Murin de Daubenton


Cavernicole en hiver, l'espèce s'accroche aux parois des cavités souterraines (grotte, tunnel, cave, etc.). Elle se réfugie parfois au fond d'un interstice, en particulier sous les ponts. L'espèce peut aussi occuper en hiver des gîtes sylvestres si les gîtes souterrains manquent. En période estivale, les colonies s'installent volontiers dans des gîtes sylvestres : loge de pic, plaque d'écorce décollée, chablis, carie. Ces colonies peuvent être composées de femelles et de leurs petits, mais aussi de mâles regroupés en nombre. Parfois les colonies sont mixtes, quelques femelles et leurs jeunes rejoignant le groupe de mâles. Le nombre de gîtes utilisés durant la saison peut être très élevé, jusqu'à une quarantaine. Ces gîtes sont en général placés près de la lisière et jamais très loin des cours d'eau. Le Murin de Daubenton affectionne aussi beaucoup les cavités artificielles des ponts et autres tunnels sous lesquels l'eau circule. Auquel cas, la colonie se maintient dans ce gîte durant la saison.

Contactée sur plus de la moitié des points, l'espèce affiche un niveau moyen d'activité faible à modéré (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). L'espèce est contactée à plusieurs reprises le long du parcours, en périphérie de l'usine, surtout à proximité de la grande lagune située à l'ouest de cette usine (Graph. 11, Carte 12). Le Murin de Daubenton est absent des points du parcours et des points d'écoute situés au nord (point 1, 1bis et 3).


Durant l'ensemble des sessions, l'activité est plus importante au point 7, en rive de lagune, plus particulièrement durant la session automnale où l'activité est continue (Graph. 30, Graph. 31).

Sur les autres points signalant sa présence, l'espèce apparaît un peu plus fréquemment au point 5 en période estivale et au point 6 en période automnale, soit dans le secteur où les contacts le long du parcours sont concentrés.


Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique durant les deux périodes d'étude.



Graph. 30 : évolution de l'activité moyenne du Murin de Daubenton durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute



Graph. 31 : évolution de l'activité moyenne du Murin de Daubenton durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute



Carte 12 : localisation de l'activité du Murin de Daubenton

ii - La Sérotine commune


La Sérotine commune est une espèce anthropophile. Les individus isolés se logent dans les interstices des bâtiments. Les colonies affectionnent les bâtiments bien exposés au soleil, se logeant volontiers entre la couverture et l'isolation d'une toiture.

La Sérotine commune est répertoriée sur plus de la moitié des points d'écoute avec un niveau moyen d'activité faible (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). Le long du parcours, les contacts se concentrent sur une piste séparant deux cordons de Pinède (Graph. 11, Carte 13). L'ensemble des données signale la présence de l'espèce dans la moitié nord de l'aire d'étude.

Durant les sessions estivales, sa fréquentation est ponctuelle aux points 1, 1bis, 2 et 5. Elle se maintient plus longtemps en début de nuit aux points 3 et 4 (Graph. 32).

Un contact enregistré au point 3 entre 20 et 30 minutes après le coucher du soleil évoque la proximité d'un gîte anthropique.

L'espèce est contactée ponctuellement durant la session automnale aux points 1bis et 5.




Graph. 32 : évolution de l'activité moyenne de la Sérotine commune durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute

iii - Le Grand rhinolophe


Format de beaux essaims quand les effectifs sont importants, le Grand Rhinolophe occupe des gîtes de grand volume, comme les cavités souterraines en hiver où il se suspend aux parois rocheuses, et les combles en période estivale où il se suspend à la couverture. Une telle dépendance à des gîtes de plus en plus rares implique de fait une certaine rareté de l'espèce.

La Grand rhinolophe est répertoriée sur la majorité des points d'écoute avec un niveau moyen d'activité faible (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). En effet l'espèce n'est contactée qu'à une quelques reprises par points par session.

Il n'est contacté qu'à une seule reprise le long du parcours (Graph. 11, Carte 15). L'ensemble des données signale la présence de l'espèce dans la moitié nord de l'aire d'étude.



Carte 13 : localisation de l'activité de la Sérotine commune



Carte 14 : localisation de l'activité du Grand Rhinolophe

c - Les espèces peu communes

i - Le Murin de Natterer

En période estivale, le Murin de Natterer utilise quasi exclusivement les gîtes sylvestres pour constituer ses colonies comme pour s'isoler.

Le Murin de Natterer est répertorié sur les quatre points situés à l'est de l'aire d'étude et est absent du parcours (point 1, 2, 7 et 8, Carte 15). Avec un niveau d'activité très faible, l'espèce n'apparaît que ponctuellement durant les sessions estivales (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7). Les points concernés sont situés en dehors de secteurs en activité de la carrière.

Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique durant les deux périodes d'étude.

ii - Le Murin à moustaches

En période estivale, les colonies de Murin à moustaches apprécient surtout les gîtes anthropiques comme l'espace entre les battants des volets et le mur, entre le bardage et le mur des maisons, entre les linteaux à l'entrée des vieux bâtiments, dans les disjointements des ponts, etc. En général de manière isolée, des spécimens peuvent s'accommoder des bourrelets ou des cavités naturelles étroites des vieux troncs. En phase hivernale, l'espèce apprécie les fissures et les disjointements étroits des ponts, et se réfugie volontiers dans les grottes et autres cavités souterraines, accolée à la paroi ou caché au fond d'une anfractuosité.

Le Murin à moustaches est répertorié sur trois points situés à l'est de l'aire d'étude en dehors de la zone de la carrière en activité. Il est contacté au cœur de celle-ci au point 6. (Carte 16). Avec un niveau d'activité très faible (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7) l'espèce n'apparaît que ponctuellement durant les deux périodes d'activité suivies.

Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique durant les deux périodes d'étude.

iii - La Noctule commune


L'espèce est répertoriée sur trois points au sud, au centre nord et au nord de l'aire d'étude (point 7, 4 et 3, Carte 17). Avec un niveau d'activité très faible l'espèce n'apparaît que ponctuellement durant les sessions estivales (Tableau 3, Graph. 5, Graph. 7).

Aucune activité crépusculaire n'évoque la proximité d'un gîte sylvestre ou anthropique durant les deux périodes d'étude.


d - Les espèces localisées

Au total, quatre espèces sont localisées à un ou deux points d'écoute, à raison de un à quelques contacts enregistrés :


- L'Oreillard roux, aux points 5 et 7 durant la session automnale, avec plusieurs apparitions au point 5 ;
- La Pipistrelle pygmée, aux points 4 et 7 durant la première session estivale ;
- Le Murin de Bechstein, aux points 2 et 8 durant la session automnale ;
- Le Murin d'Alcathoe, au point 5 durant la session automnale.



Carte 15 : localisation de l'activité du Murin de Natterer



Carte 16 : localisation de l'activité du Murin à moustaches



Carte 17 : localisation de l'activité de la Noctule commune

C - Synthèse des niveaux de fréquentation

Cette synthèse s'appuie sur l'analyse de l'association des niveaux de présence (proportion de points d'écoute couverte) et le niveau d'activité moyenne (nombre de contacts moyen par nuit, par point). Le tableau suivant (Tableau 4) fait la synthèse des niveaux de fréquentation spécifique et de la présence possible de gîtes.

Nom vernaculaire	Niveau de présence	Niveau d'activité	Niveau de fréquentation	Gîtes envisagés à proximité
Pipistrelle commune	Élevé	Élevé	Élevé	Anthropiques (points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8)
Pipistrelle de Kuhl	Élevé	Élevé	Élevé	Anthropiques (points 1, 2, 3 et 4)
Oreillard gris	Élevé	Faible	Moyen	
Pipistrelle de Nathusius	Élevé	Faible	Moyen	Sylvestre (point 3)
Barbastelle d'Europe	Élevé	Faible	Moyen	Sylvestre ou anthropique (point 2)
Noctule de Leisler	Élevé	Faible	Moyen	
Murin de Daubenton	Moyen	Faible à moyen	Moyen	
Sérotine commune	Moyen	Faible	Faible à moyen	Anthropiques (point 3)
Grand rhinolophe	Moyen	Très faible	Faible	
Murin de Natterer	Faible	Très faible	Faible à très faible	
Murin à moustaches	Faible	Très faible	Faible à très faible	
Noctule commune	Faible	Très faible	Faible à très faible	
Oreillard roux	Très faible	Très faible	Très faible	
Pipistrelle pygmée	Très faible	Très faible	Très faible	
Murin de Bechstein	Très faible	Très faible	Très faible	
Murin d'Alcathoe	Très faible	Très faible	Très faible	

Tableau 4 : évaluation des niveaux d'enjeu chiroptérologique au sein de l'aire d'étude

Ainsi, la zone d'étude est fréquentée :

- Avec un niveau élevé, moyen à élevé ou moyen :
 - o Incluant la proximité envisagée d'un gîte, par :
 - La Pipistrelle commune ;
 - La Pipistrelle de Kuhl ;
 - La Pipistrelle de Nathusius ;
 - La Barbastelle d'Europe ;
 - o N'incluant pas la proximité envisagée d'un gîte, par :
 - L'Oreillard gris ;
 - La Noctule de Leisler ;
 - Le Murin de Daubenton ;
- Avec un niveau faible à moyen :
 - o Incluant la proximité envisagée d'un gîte, par :
 - La Sérotine commune
- Avec un niveau faible, ou faible à très faible ou très faible :
 - o N'incluant pas la proximité envisagée d'un gîte, par :
 - Le Grand Rhinolophe ;
 - Le Murin de Natterer
 - Le Murin à moustaches
 - La Noctule commune
 - L'Oreillard roux
 - La Pipistrelle pygmée
 - Le Murin de Bechstein
 - Le Murin d'Alcathoe.

La diversité chiroptérologique et le niveau d'activité sont nettement plus importantes au point 7, le milieu aquatique manifestant une attractivité importante, en particulier pour la Pipistrelle commune. Concernant les autres points, la diversité et la densité évoluent de manière indépendante sans tendance évidente. Les données parcours évoque cependant une attractivité du milieu aquatique, de la Pinède et des fourrées. Les Chiroptères n'exploitent pas les secteurs ouverts de la carrière.

D - Synthèse des potentialités de gîtes


Les données permettent de mettre en évidence des émergences crépusculaires sur la quasi-totalité des points évoquant la présence potentielle de gîtes à proximité. Cinq espèces sont concernées par la présence potentielle de gîtes : la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d'Europe et la Sérotine commune.

Le bâti à l'intérieur et en périphérie de l'aire d'étude peut accueillir des gîtes anthropiques de la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d'Europe et la Sérotine commune.

Au sein de l'aire d'étude, les potentialités de gîtes sylvestres concernant la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d'Europe sont tributaires de la qualité des boisements.

Au regard de la cartographie des habitats effectué en 2019 et fournie par le bureau d'études Dervenn, les niveaux potentialités suivants sont envisagés (Carte 18) :

- Moyen au niveau des boisements mixtes ;
- Faible au niveau des boisements de Conifères.



Carte 18 : localisation des gîtes potentiels pour les Chiroptères sur l'aire d'étude

III - CONCLUSION

L'inventaire des Chiroptères et l'étude de leur activité est menée sur huit points d'écoute et un parcours durant deux sessions estivales (mise-bas et élevage des jeunes) et une session automnale (transit automnal).

L'analyse de l'activité des Chiroptères s'appuie sur la compilation de l'ensemble des données collectées durant 198 heures d'écoute nocturne sur point et 6,3 heures d'écoute sur parcours. Cet effort a permis d'identifier 16 espèces de Chiroptères. La région Bretagne compte 22 espèces régulièrement observées. Ainsi, la diversité chiroptérologique estivale peut être considérée comme moyenne à élevée.

L'aire d'étude est fréquentée de manière importante par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d'Europe, L'Oreillard gris, la Noctule de Leisler et le Murin de Daubenton. D'ailleurs, la majorité de ces espèces est détectée le long du parcours.

La présence d'autres espèces au niveau de fréquentation plus faible renforce au demeurant l'intérêt chiroptérologique de l'aire d'étude.

Les données collectées le long des parcours, associées aux caractéristiques des milieux, confirment l'attractivité des boisements, des friches ou fourrés et des milieux aquatiques. Ces habitats sont exploités de manière importante par les Chiroptères dans leur quête alimentaire.

Cette étude apporte ainsi les éléments nécessaires à l'évaluation des enjeux réglementaires et conservatoires chiroptérologiques qui sera réalisée par le maître d'œuvre dans la continuité de l'étude.

Cette étude met aussi en évidence, au sein ou à proximité de l'aire d'étude :

- La présence potentielle de gîtes dans les bâtiments et autres ouvrages concernant la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d'Europe et la Sérotine commune ;
- La présence potentielle de gîtes sylvestres concernant la Pipistrelle de Nathusius, la Barbastelle d'Europe.

Même si les relevés ponctuels n'évoquent pas d'émergences crépusculaires des autres espèces, l'utilisation de gîtes sylvestre ou anthropiques, au moins par des individus isolés, reste possible pour des espèces comme la Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, la Noctule commune.

Au regard des caractéristiques de habitats arborés, les potentialités de gîtes sont moyennes dans les boisements mixtes et sont faibles dans les boisements de Conifères. Les bâtiments situés au sein de l'aire d'étude peuvent accueillir des gîtes anthropiques, mais ces derniers peuvent aussi exister en périphérie de l'aire d'étude.

D'une manière générale, pour conserver les niveaux de fréquentation des Chiroptères, les premières prescriptions en ce qui concerne les aménagements sont :

- De s'assurer de l'absence de Chiroptères au sein des bâtiments avant leur destruction ou leur aménagement. En cas de présence, des mesures de réduction pourront être engagées pour ne pas risquer de porter atteinte à des spécimens de Chiroptères ;
- De s'assurer de l'absence de gîtes sylvestres dans les secteurs de boisement mixte avant tout opération d'abattage. En cas de présence, des mesures de réduction pourront être engagées pour ne pas risquer de porter atteinte à des spécimens de Chiroptères (intervention hors occupation de gîte, obturation de cavité en l'absence de Chiroptères avant la coupe, pose de chaussette anti-retour, etc.) ;
- De s'assurer de la conservation de la trame verte (boisement, haie et fourré) et de la trame bleue (plan d'eau) au sein de l'aire d'étude ;

TABLE DES ILLUSTRATIONS

INDEX DES TABLEAUX

Tableau 1 : durée de l'écoute de l'activité des Chiroptères et de la phase nocturne	14
Tableau 2 : liste des espèces de Chiroptères répertoriées le long du parcours et nombre de contacts par point et par session	20
Tableau 3 : liste des espèces de Chiroptères répertoriées sur les points d'écoute et nombre de contacts par point et par session	21
Tableau 4 : évaluation des niveaux d'enjeu chiroptérologique au sein de l'aire d'étude	51

INDEX DES GRAPHIQUES

Graph. 1 : évolution de la température durant la session du 04/06/2020	15
Graph. 2 : évolution de la température durant la session du 02/07/2020	15
Graph. 3 : évolution de la température durant la session du 27/08/2020	15
Graph. 4 : proportion des contacts générés par les Chiroptères sur les points d'écoute (hors Pipistrelles commune et Pipistrelle de Kuhl)	22
Graph. 5 : répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères récoltés le protocole points d'écoute	22
Graph. 6: répartition du nombre de contacts par espèce de Chiroptères récoltés le protocole parcours	22
Graph. 7 : taux de couverture des points d'écoute et niveau moyen d'activité pour chaque espèce ou taxon	23
Graph. 8 : niveaux de diversité et d'activité en fonction des points d'écoute	23
Graph. 9 : niveaux d'activité en fonction des points d'écoute et des espèces	24
Graph. 10 : distribution de la présence des Chiroptères le long du parcours	25
Graph. 11 : distribution des proportions pondérées de mailles-tronçon-parcours en fonction de la présence de Chiroptères et du linéaire de haie	25
Graph. 12 : distribution des points parcours en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière de boisements	27
Graph. 13 : distribution des points parcours en fonction de la présence de contacts et de la distance aux friches	27
Graph. 14 : distribution des points parcours en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière des landes sèches	27
Graph. 15 : distribution des points parcours en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière des roselières	27
Graph. 16 : distribution des points parcours en fonction de la présence de contacts et de la distance à la lisière des plans d'eau	28
Graph. 17 : évolution de l'activité moyenne des Chiroptères durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute	29
Graph. 18 : évolution de l'activité moyenne des Chiroptères durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute	29
Graph. 19 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle commune durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute	30
Graph. 20 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle commune durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute	30
Graph. 21 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle de Kuhl durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute	32
Graph. 22 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle de Kuhl durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute	32
Graph. 23 : évolution de l'activité moyenne de l'Oreillard gris durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute	34
Graph. 24 : évolution de l'activité moyenne de l'Oreillard gris durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute	34
Graph. 25 : évolution de l'activité moyenne de la Pipistrelle de Nathusius durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute	36

Graph. 26 : évolution de l'activité moyenne de la Barbastelle d'Europe durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute.....	38
Graph. 27 : évolution de l'activité moyenne de la Barbastelle d'Europe durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute.....	38
Graph. 28 : évolution de l'activité moyenne de la Noctule de Leisler durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute.....	40
Graph. 29 : évolution de l'activité moyenne de la Noctule de Leisler durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute.....	40
Graph. 30 : évolution de l'activité moyenne du Murin de Daubenton durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute.....	42
Graph. 31 : évolution de l'activité moyenne du Murin de Daubenton durant la session automnale en fonction de chaque point d'écoute.....	42
Graph. 32 : évolution de l'activité moyenne de la Sérotine commune durant les sessions estivales en fonction de chaque point d'écoute.....	44

INDEX DES CARTES

Carte 1 : localisation de l'aire d'étude.....	5
Carte 2 : localisation des protocoles points d'écoute et parcours sur vue aérienne.....	8
Carte 3 : localisation des protocoles points d'écoute et parcours sur IGN.....	9
Carte 4 : cartographie des habitats en 2019 (source : AXE via Dervenn).....	13
Carte 5 : localisation des contacts de toutes les espèces de Chiroptères.....	26
Carte 6 : localisation de l'activité de la Pipistrelle commune.....	31
Carte 7 : localisation de l'activité de la Pipistrelle de Kuhl.....	33
Carte 8 : localisation de l'activité de l'Oreillard gris.....	35
Carte 9 : localisation de l'activité de la Pipistrelle de Nathusius.....	37
Carte 10 : localisation de l'activité de la Barbastelle d'Europe.....	39
Carte 11 : localisation de l'activité de la Noctule de Leisler.....	41
Carte 12 : localisation de l'activité du Murin de Daubenton.....	43
Carte 13 : localisation de l'activité de la Sérotine commune.....	45
Carte 14 : localisation de l'activité du Grand Rhinolophe.....	46
Carte 15 : localisation de l'activité du Murin de Natterer.....	48
Carte 16 : localisation de l'activité du Murin à moustaches.....	49
Carte 17 : localisation de l'activité de la Noctule commune.....	50
Carte 18 : localisation des gîtes potentiels pour les Chiroptères sur l'aire d'étude.....	53

INDEX DES PHOTOGRAPHIES

Photo. 1 : Batcorder 3.0 et son environnement au point 1 (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 2 : environnement au point 1 (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 3 : Batcorder 3.0 au point 1bis (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 4 : environnement au point 1bis (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 5 : Batcorder 3.0 au point 2 (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 6 : environnement au point 2 (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 7 : Batcorder 3.0 au point 3 (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 8 : environnement au point 3 (O-GEO, le 04/06/2020).....	10
Photo. 9 : batcorder 3.0 au point 4 et son environnement (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 10 : batcorder 3.0 au point 5 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 11: batcorder 3.0 au point 6 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 12 : environnement au point 6 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 13: batcorder 3.0 au point 7 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 14: environnement au point 7 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 15 : mini-Batcorder et de son environnement au point 8 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11
Photo. 16 : environnement au point 8 (O-GEO, le 04/06/2020).....	11